

ハダニに、 サビダニに、 効く理由。

殺ダニ剤 **スター・マイト**
プラス® プロアブル

殺ダニ剤「スター・マイト」に、あの「サンマイト」をプラス。

シェノピラフェン + ピリダベン のダブル効果!



だから…

- 各種ハダニにも、サビダニにも、きちんと効く。
- 卵から成虫までの全ステージに、しっかりと効く。


卓効「スター・マイト」に、 あの「サンマイト[®]」をプラス！

殺ダニ剤 **スター・マイト**
プラス ® プロアブル


農林水産省登録第23505号
有効成分：シエノピラフェン...15.0%
ビリダベン.....7.5%
人畜毒性：医薬用外劇物
容 量：500ml入

●有効成分「シエノピラフェン」が

①ミカンハダニに、しっかり効く




②カンザワハダニに、しっかり効く




●有効成分「ピリダベン」が

③ミカンサビダニに、しっかり効く



④チャノホコリダニにも有効



■適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シエノピラフェンを含む農薬の総使用回数	ピリダベンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ミカンハダニ サビダニ類 チャノホコリダニ	1000倍	200~700ℓ/10a	収穫7日前まで	1回	散布	2回以内	2回以内
	カンザワハダニ サビダニ類 チャノホコリダニ		200~400ℓ/10a	摘採14日前まで			1回	

■使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 使用に際しては容器をよく振る。
- 石灰硫黄合剤とは混用を避ける。
- ボルドー液との混用及び14日以内の近接散布は効果が劣るので避ける。
- 敷設量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ、調節する。
- 本剤は植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないように葉の裏表に十分に散布する。
- ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布しないようにていねいに散布する。
- ミツバチに対して影響があるので、以下に注意する。
 - ① ミツバチの巣箱及びその周辺にからないようにする。
 - ② 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。
 - ③ 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。

- 蚊に対して影響があるので、周辺の桑葉にはからないようにする。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意する。
誤って飲み込んだ場合は吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせる。本剤使用中に身体に異常を感じた場合は医師の手当てを受ける。
- 敷設の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換する。作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体质の人は取扱いに十分注意する。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2018年7月現在の登録内容に基づいています。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号
ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>
お客様窓口 TEL.03-4463-8271(9:00~17:30 土日祝日除く)