

イネ科雑草も 広葉雑草もこの1剤で。

®は日産化学(株)の登録商標

日産 畑作用土壌処理除草剤

ラクサー® 粒剤

アラクロールがイネ科雑草に効く!

リニュロンが広葉雑草に効く!



メヒシバ



ノビエ



イヌタデ



イヌホオズキ

8kg/10a#散布で
イヌホオズキ、タデ類に
さらに効果アップ!

#だいた、えだまめの場合。




ラクサーなら、2つの有効成分でワイドにカバー!!

雑草名 有効成分	イネ科				広葉											
	ノビエ	メヒシバ	オヒシバ	エノコログサ	カヤツリグサ	シロザ	ハコベ	スベリヒユ	タカサブロウ	センダングサ	アメリカ	イヌビユ	ハキダメギク	イヌホオズキ	タデ類	ツユクサ
アラクロール	◎	◎	◎	◎	◎	□	◎	◎	○	○	□	○	○	○	○	◎*
リニュロン	○	○	○	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	□
ラクサー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎**	◎*

*2成分の混合効果による。 *8kg/10a散布の場合。

殺草効果:◎(極大)、○(大)、□(中)、△(小)、×(無)

2つの有効成分でイネ科も広葉もしっかり抑えます!



■適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	アラクロールを含む農薬の総使用回数	リニュロンを含む農薬の総使用回数
だいず えだまめ	一年生雑草	は種後出芽前 (雑草発生前)	4~8kg/10a	1回	全面土壌散布	1回	2回以内 (全面土壌散布は1回以内、 雑草茎葉兼土壌散布は 1回以内)
ばれいしょ		植付後萌芽前 (雑草発生前)	4~6kg/10a				1回

▲使用上の注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使い切ってください。
- 発芽後の雑草に対しては効果が劣るので、雑草発生前に時期を失しないように散布してください。
- 砕土、整地は丁寧に、種子が露出しないように覆土はできるだけ丁寧に、覆土深を2~3cm以上としてください。
- 土壌が極端に乾燥している場合には効果が劣るので、土壌が適度の水分を含んでいるときに使用してください。
- 水はけの悪い圃場及び過湿条件では薬害のおそれがあるので使用をさけてください。
- 散布後に多量の降雨が予想される場合には薬害を生ずるおそれがあるので使用をさけてください。
- 砂土では使用しないでください。
- 砂質土の保水力の小さい圃場では使用しないでください。

- 空容器等は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2019年6月現在の登録内容に基づいています。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号
ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>
お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00~17:30 土日祝日除く)