

かきの  の

カイガラムシ類、

アザミウマ類 に

適用拡大になりました。

これにより、**カメムシ、カキノヘタムシガ** との

**同時防除**が可能になりました!



フジコナ  
カイガラムシ



チャノキイロ  
アザミウマ



カキクダ  
アザミウマ



チャバネアオ  
カメムシ



カキノヘタムシガ

日産

**エルサン**® 水和剤 40

〈PAP水和剤〉

殺虫剤



さらに使い方が広がります!

農林水産省登録第 8618号  
有効成分：PAP・・・40.0%  
人畜毒性：医薬用外劇物  
容量：500g入、1kg入

# 日産 エルサン®水和剤 40

さらに使い方が  
広がります！

エルサンなら カメムシ、カキノヘタムシガ、


カイガラムシ類、アザミウマ類 の **同時防除**ができます！

## カキクダアザミウマへの効果

	葉巻数 (5/14)	被害果率 (%) (6/28)	被害度 (6/28)
エルサン水和剤 800倍	0	0	0
対照剤 A 1500倍	0	0	0
無処理区	4	20%	6.7

2016年福井植物防疫協会（福井県あわら市）  
少発生；4/23、5/14、5/24の3回処理  
5/14；葉巻数調査、6/28；300果被害調査

## フジコナカイガラムシへの効果




2016年日本植物防疫協会山梨試験地（山梨県山梨市南）多発生；6/24処理

## チャノキイロアザミウマへの効果

	被害果率 (%)	被害度
エルサン水和剤 800倍	0	0
対照剤 C 1500倍	0	0
無処理区	19%	3.4


2014年福井植物防疫協会（福井県あわら市）  
中発生；5/19、6/2、6/15の3回処理  
7/25に300果調査

## チャバネアオカメムシへの効果



1975年香川 6/9、8/4、8/14処理、収穫時調査

## カキノヘタムシガへの効果



2014年奈良県植物防疫協会（奈良県五條市）  
多発生；8/11処理 8/25調査

## 適用害虫と使用方法

（2019年1月現在の登録内容）

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	PAPを含む農薬の総使用回数
かき	コナカイガラムシ類 カメムシ類 アザミウマ類 カキノヘタムシガ	800倍	200~700ℓ/10a	収穫30日前まで	4回以内	散布	4回以内

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ●本剤は小児の手の届くところには置かないで下さい。

本資料は2019年1月現在の登録内容に基づいています。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号  
ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>  
お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00~17:30 土日祝日除く)

ELS-WHO2A