

# カイガラムシに優れた効果



りんごの害虫防除に!  
カメムシにも有効!

## 日産エルサン<sup>®</sup>水和剤 40



クワコナカイガラムシ



チャバネアオカムシ/クサギカムシ



ミダレカクモンハマキ(幼虫)



モモシンクイガ(幼虫)


# 日産エルサン®水和剤40

成分:ジメチルジチオホスホリルフェニル酢酸エチル(PAP)…40.0% 毒性:医薬用外劇物

## カイガラムシに優れた効果を示します。

### <クワコナカイガラムシ>

2013年福島市現地りんご園(総合防除コンサル株式会社委託試験)  
10月13日処理、処理8日後調査




## カメムシもしっかり抑えます。

### <チャバネアオカメムシ>

2002年日植防茨城

7月20日処理、1、3、7日後調査、品種ふじ、放虫、多発生



## 適用害虫と使用方法(落葉果樹)

適用作物	適用害虫	希釈倍数	10アール当たり 使 用 液 量	使用時期	本剤及びPAPを含む 農 薬 の 総 使用 回 数	使用方法
りんご	クワコナカイガラムシ モモシンクイガ ハマキムシ類 マイマイガ幼虫 モモチョッキリゾウムシ カメムシ類	1,000倍	200~700ℓ	収穫45日前 まで	本剤:2回以内 PAP剤:2回以内 (樹幹散布は1回以内)	散布
なし	クワコナカイガラムシ カメムシ類 アブランシ類 シンクイムシ類 ナシキジラミ	800~ 1,000倍	200~700ℓ	収穫60日前 まで	2回以内	散布
	ハマキムシ類 ナシミハバチ	800倍				
かき	カメムシ類 コナカイガラムシ類 アザミウマ類 カキノヘタムシガ	800倍		収穫30日前 まで	4回以内	

2018年10月現在の登録内容です。

## エルサン水和剤の使用適期(りんご)

推奨使用時期①:落花10~20日後

推奨使用時期②:展葉1週間後

4月	5月	6月	7月
	推奨②		推奨①

## 効果・薬害等の注意

- 石灰硫黄合剤、ボルドー液等アルカリ性薬剤との混用はさけるか、散布直前に混合してください。
- りんごに使用する場合、旭種に対しては薬害を生ずるおそれがありますので使用しないでください。また、混植園ではからないように注意して散布してください。
- 赤色りんごに対しては、8月以降使用しないでください。
- ぶどうには薬害を生ずるおそれがありますのでからないように注意してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはからないようにしてください。

## 安全使用上の注意

- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。万一中毒を感じた場合、あるいは誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けてください。

- ミツバチに対して影響があるので以下のことについてください。
  - ミツバチの巣箱及びその周辺にかかるないように注意してください。
  - 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用はさせてください。
  - 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。

- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用し、作業後は顔、手足など皮膚の露出部を石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号  
ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>  
お客様窓口 TEL.03-4463-8271(9:00~17:30 土日祝日除く)

ELS-WHA10A