

病原菌を 直接たたけ！

遊走子

厚膜孢子

オラクルは、作物に感染する「遊走子」に直接作用。
有効成分が地際部にとどまるため、疫病から長期間守ります。

たばこ疫病用

殺菌剤

オラクル®

顆粒水和剤




有効成分が地際部にとどまるから、疫病の発生を長期間抑えます。

作物に感染する「遊走子」に直接作用します。


薬剤はたばこに浸透移行することがなく、栽培中は土壌に残存します。

感染前の株元への灌注、または土壌表面散布で、疫病の発生を長期間抑え続けます。

希釈した薬液を株元中心に灌注、または、土壌表面散布してください。




たばこ疫病の遊走子に直接作用。



予防効果は約1ヶ月間持続します。

【お薦め使用時期例】



各剤の散布間隔は約2週間

オラクル → 殺虫剤 → オラクル → 殺虫剤

オラクル顆粒水和剤の、
予防効果は
約1ヶ月間持続します。

■適用病害と使用方法(抜粋)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アミスルプロムを含む農薬の総使用回数
たばこ	疫病	2,000倍	100~200ml/株 200~400ℓ/10a	収穫10日前まで	2回以内	株元灌注 土壌表面散布	2回以内

⚠ 使用上の注意事項(抜粋)

- 石灰硫黄合剤やボルドー液等アルカリ性農薬との混用はさけてください。
- たばこに使用する場合、薬液が葉にかからないように散布してください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。

- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするともに洗眼してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2018年7月現在の登録内容に基づいています。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号
ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>
お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00~17:30 土日祝日除く)