

病原菌を
直接たたけ！

遊走子

孢子球

ばれいしょ 粉状そうか病用

殺菌剤

オラクル®

粉剤/顆粒水和剤

オラクルは、孢子球から
とびだす「遊走子」に直接作用。
だから、粉状そうか病を
しっかり予防、
大切な作物を守ります。

※イラストはイメージです ⑧は日産化学(株)の登録商標

ばれいしょ 粉状そうか病用

殺菌剤


オラクル®

粉剤/顆粒水和剤

	登録番号	有効成分 アミスルブロム	毒性	性状	荷姿
粉 剤	第22800号	0.50%	普通物*	類白色粉末45 μ m以下	3kg/15kg
顆粒水和剤	第22799号	50.0%	普通物*	淡褐色水和性細粒	300g/1.5kg

★毒劇物に該当しないものを指している通称

オラクルは、粉状そうか病の遊走子に直接作用。



だから、粉状そうか病の感染をしっかり予防。

試験写真 2008年 北植防委託試験 (岩見沢市 栗沢町)



オラクル




対照剤A



無処理

ばれいしょ粉状そうか病圃場試験結果 調査日: 8月26日



発病度 = (発病指数 × 塊茎数) / Σ (最大発病指数 × 総塊茎数)
防除率 = (1 - 試験薬剤発病度 / 無処理発病度) %

粉剤の適用病害と使用方法(抜粋)

適湿な土壤水分で処理してください(土を握ってすぐ崩れる程度)。

作物名	適用病害	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アミスルブロムを含む 農薬の総使用回数
ばれいしょ	粉状そうか病	20kg/10a	植付前	1回	全面土壌混和	5回以内 (植付前は1回以内、 植付後は4回以内)

顆粒水和剤の適用病害と使用方法(抜粋)

全面散布時は、適湿な土壤水分で処理してください(土を握ってすぐ崩れる程度)。

作物名	適用病害	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アミスルブロムを含む 農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
ばれいしょ	粉状そうか病	250g/10a	100ℓ/10a	植付前	1回	全面散布後 土壌混和	5回以内 (植付前は1回以内、 植付後は4回以内)

⚠ 使用上の注意事項(抜粋)

【顆粒水和剤】

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。

【粉剤】

- 砕土をよく行った後、所定量の薬剤を均一に散布し、土壌と十分に混和してください。なお、降雨直後の処理は混和むらの原因となるのでさけてください。
- 散布の際は農業用マスクなどを着用してください。作業後はうがいをしてください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2018年7月現在の登録内容に基づいています。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号

ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>

お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00~17:30 土日祝日除く)

ORC-SHB6A