



速く効く。
 あの手虫にも効く。^{*1}
 だから、
 収量に差がつく。^{*2}



無処理 残葉率 0%



A剤 残葉率 20%



グレースシア乳剤 残葉率 90%

食害される前に駆除できる。^{*}

野菜・
茶用
殺虫剤

グレースシア[®] 乳剤



- 有効成分フルキサメタミド配合。抵抗性コナガにも卓効
- 葉内に薬剤が浸透、葉裏の害虫も退治
- 幅広いチョウ目害虫に効果
- 殺虫効果は約2週間持続



*1 作物によって適用害虫は異なります。詳しくは裏面をご覧ください。

*2 効果は害虫の発生密度や天候、栽培環境等によって異なる場合があります。

※ グレースシア乳剤のハスモンヨトウ終齢幼虫に対する速効性試験 2018年日産化学生物科学研究所(社内試験)【試験方法】虫体浸漬、処理1時間後餌入、20時間後撮影

速く効く。あの害虫にも効く。

グレーシア[®] 乳剤

適用害虫と使用方法

*本剤及びフルキサメタミドを含む農薬の総使用回数の制限を示す。

農林水産省登録 第24185号 有効成分 フルキサメタミド…10.0%
人畜毒性：普通物 (毒劇物に該当しないものを指している毒物) 容量：100ml入、250ml入、500ml入、5L入

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法		
さといも	ハダニ類	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布		
	ハスモンヨトウ	2000～3000倍						
かんしょ	ナカジロシタバ、ハスモンヨトウ、コナジラミ類、ハダニ類、アリモドキゾウムシ、イモソウムシ			収穫前日まで				
やまのいも	ハスモンヨトウ							
かぶ	キスジノミハムシ、コナガ	2000倍						
だいこん	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、カブラハバチ類、キスジノミハムシ							
キャベツ、はくさい	コナガ、アオムシ、ウババエ類、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ、オオタバコガ、アザミウマ類、シロイチモジヨトウ	2000～3000倍		収穫7日前まで				
はなやさい類 (ブロッコリー、カリフラワー、茎ブロッコリー)	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ウババエ類、オオタバコガ、ハイマダラノメイガ、アザミウマ類、シロイチモジヨトウ	3000倍		1回				
非結球あぶらな科葉菜類	コナガ、アオムシ							
レタス、非結球レタス	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ナモグリバエ、アザミウマ類、シロイチモジヨトウ	2000～3000倍		収穫3日前まで			2回以内	
しそ科葉菜類 (えごま(葉)を除く)	アザミウマ類	2000倍	収穫7日前まで					
しそ(花穂)								
たまねぎ	ハモグリバエ類、アザミウマ類	2000～3000倍	1L/m ²	収穫7日前まで	本剤：2回以内 フルキサメタミド剤：4回以内 (苗浸漬は1回以内、 株元灌注は1回以内、 散布は2回以内)	株元灌注		
ねぎ	ネギコガ、ハモグリバエ類、シロイチモジヨトウ、アザミウマ類、クロバネキノコバエ類			2000倍			収穫21日前まで	
にら	アザミウマ類、クロバネキノコバエ類	2000倍	-	植付時	本剤：1回	30分間苗浸漬		
			1L/m ²	収穫14日前まで				
ヤングコーン	ハダニ類	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	本剤：1回	フルキサメタミド剤：2回以内 (株元灌注は1回以内、 散布は1回以内)		
未成熟とうもろこし				1回				
トマト、ミニトマト	ハスモンヨトウ、オオタバコガ、コナジラミ類、アザミウマ類、トマトサビダニ、ハモグリバエ類、トマトキバガ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布		
ピーマン及びとうがらし類	オオタバコガ、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類、チャノホコリダニ							
なす	コナジラミ類、アザミウマ類、ハダニ類、チャノホコリダニ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハモグリバエ類							
きゅうり	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、ウリノメイガ、ハダニ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類							
すいか、メロン	オオタバコガ、ウリノメイガ、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類							
豆類 (種実、ただし、あずき、らっきょうを除く)	ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、アザミウマ類			2000～3000倍			100～500L/10a	収穫14日前まで
あずき	アズキノメイガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、アザミウマ類							
だいず	アザミウマ類、マメシクイガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、ウコンノメイガ、オオタバコガ、フタスジヒメハムシ、ハダニ類			2000倍			100～300L/10a	収穫前日まで
えだまめ	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類							
いちご	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハダニ類			2000～3000倍			100～300L/10a	収穫前日まで
アスパラガス	ハスモンヨトウ、アザミウマ類、ハダニ類、ジュウシホシクビナガハムシ							
オクラ	ハスモンヨトウ、オオタバコガ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで				
しょうが	ハスモンヨトウ							
らっきょう	ネダニ類	2000倍	1L/m ²	収穫30日前まで	本剤：2回以内 フルキサメタミド剤：5回以内 (種実への処理は1回以内、 株元灌注は2回以内、 散布は2回以内)	株元灌注		
	ホモノハダニ	1000倍	-	植付前				
にんにく	チューリップサビダニ	2000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	本剤：2回以内	散布		
				収穫7日前まで				
茶	チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、マダラカサハラハムシ、ヨモギエダシヤク、チャノホソガ、チャゲコナジラミ	2000～3000倍	200～400L/10a	摘採14日前まで	1回	120分間鱗片浸漬		
	サビダニ類、チャノホコリダニ							
いちじく	アザミウマ類	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布		
食用ぎく	ハスモンヨトウ、ハダニ類、オオタバコガ、アザミウマ類							
きく				発生初期				
きく(葉)				収穫14日前まで				
りんどう	リンドウホソハマキ、ハダニ類、アザミウマ類			-			-	発生初期
ゆり	ネダニ類	1回	30分間種球浸漬					

使用上の注意事項 (抜粋)

- 天敵類に影響があるので使用に際しては注意してください。●水なす、賀茂なすの果実には薬害を生じるので、使用しないでください。
- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

最新の
製品情報は
こちら



本資料は2024年3月現在の登録内容に基づいています。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号

ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>

お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00～17:30 土日祝日除く)