



速く効く。
あの害虫にも効く。
だから、
収量に差がつく。



最新型の色々な害虫に効く。^{*1}

野菜・
茶用
殺虫剤

グレースシア[®] 乳剤

- 有効成分フルキサメタミド配合。ハマキムシなどチョウ目害虫に卓効
- 殺虫効果は約2週間持続
- アザミウマ、ヨコバイ、サビダニなどの同時防除も可能^{*1}

*1 作物によって適用害虫は異なります。詳しくは裏面およびグレースシアホームページをご覧ください。*2 効果は害虫の発生密度や天候、栽培環境等によって異なる場合があります。



速く効く。あの害虫にも効く。 グレーシア[®] 乳剤

農林水産省登録 第24185号 有効成分 フルキサメタミド…10.0% 人畜毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) 容量：100ml入、250ml入、500ml入、5L入

グレーシアは、「効きの速さ」と「対象害虫の幅広さ」を兼ね備えた野菜・茶用殺虫剤です。

POINT
01

効きの速さ

害虫の口だけでなく、皮膚からも吸収されるから、作物が食べられる前に駆除できる。

POINT
02


対象害虫の幅広さ

チョウ目害虫やアザミウマ、ヨコバイ、サビダニなど幅広い害虫に卓効

お茶の主要害虫に卓効を示します。




■チャノキイロアザミウマに対する効果




2015年 福岡県農林業総合試験場八女分場
品種：さえみどり 7年生 圃場：露地
発生：中→多発生 散布量：200ℓ/10a
処理日：2015年5月29日 調査日：2015年6月11日

■チャノミドリヒメヨコバイに対する効果



2014年 福岡県農林業総合試験場八女分場
品種：さえみどり 6年生 圃場：露地
発生：甚発生 散布量：200ℓ/10a
処理日：2014年6月6日 調査日：2014年6月25日

■チャハマキに対する効果



2015年 静岡県農林技術研究所 茶業研究センター
品種：やぶきた 45年生 圃場：露地
発生：少発生 散布量：400ℓ/10a
処理日：2015年5月13日 調査日：2015年6月5日

適用害虫と使用方法

*本剤及びフルキサメタミドを含む農薬の総使用回数*の制限を示す。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量 (/10a)	使用時期	総使用回数*	使用方法
茶	チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、マダラカサハラハムシ、ヨモギエダジャク、チャノホソガ、チャトゲコナジラミ	2000倍	200~400L	摘採 14日前まで	1回	散布
	サビダニ類、チャノホコリダニ	2000~3000倍				

使用上の注意事項 (抜粋)

- 天敵類に影響があるので使用に際しては注意してください。●水なす、賀茂なすの果実には薬害を生じるので、使用しないでください。
- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

最新の
製品情報は
こちら



本資料は2024年1月現在の登録内容に基づいています。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号
ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>
お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00~17:30 土日祝日除く)