

大きくなったクサネムも しっかりたたたく!

草丈約15cm

散布前

散布26日後

草丈
約15cm



適用拡大で
さらに
使いやすく!

水稲用中後期除草剤

サンパンチ[®]

1キロ粒剤

体系で使われている一発剤の代わりに使用することで、難防除雑草の問題を解決できる新しいタイプの中期剤です。もちろん従来の中期剤と同様に、一発剤で取りこぼした雑草の防除にも使えます。

- ノビエの3.5葉期まで防除
- SU抵抗性雑草にも有効
- 難防除雑草に卓効

- ・大きくなったクサネム、クログワイ、コウキヤガラといった難防除の雑草もしっかり枯らす。
- ・3.5葉期のノビエにも高い効果を発揮。 **！** ホタルイはクログワイに似ているので注意！ホタルイは3葉期*まで

*登録上は4葉期ですが、抵抗性雑草地域では早めの散布をお願いします。

これにより

- ・初期剤との体系で、より遅くに使用でき、防除の難しいクサネムや、クログワイもしっかり防除。
- ・もちろん、従来の中期剤と同様に、一発剤でとりこぼしてしまった雑草もしっかり除草。

■各有効成分の雑草への効果

殺草効果:◎(極大)、○(大)、△(小)

雑草名 有効成分	一年生雑草				多年生雑草										その他		
	ノビエ	カヤツリグサ科	コナギ	広葉	クログワイ	シズイ	オモダカ	コウキヤガラ	ミスガヤツリ	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ヘラオモダカ	ヒルムシロ	セリ	アオミドロ	表層剥離
ハロスルフロンメチル	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○
シハロホップブチル	◎																
ベンゾピシクロン	○	◎	◎	○	○	○	△	○	◎	◎	◎	△	◎	○	△		
ジメタメトリン	△	○	○	◎												◎	◎

■各種雑草の散布適期

ホタルイ	3葉期*まで
ウリカワ	4葉期まで
ミスガヤツリ	4葉期まで
ヘラオモダカ	3葉期まで
ヒルムシロ	発生期まで
セリ	再生始期まで
オモダカ	矢じり葉3葉期まで
キシュウスズメノヒエ	3葉期まで
クログワイ	
コウキヤガラ	草丈30cmまで
シズイ	
イボクサ	茎長20cmまで
クサネム	草丈20cmまで
アオミドロ・藻類による表層剥離	発生始期まで

サンパンチ1キロ粒剤	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

■適用雑草及び使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草 及び 多年生広葉雑草 キシュウスズメノヒエ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植後15日～ ノビエ3.5葉期 但し、収穫60日前まで	1kg/10a	1 回	湛水散布 又は 無人航空機 による散布
直播水稻	一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ミスガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ	稲3葉期～ ノビエ3.5葉期まで 但し、収穫60日前まで			

シハロホップブチルを含む農薬の総使用回数	ジメタメトリンを含む農薬の総使用回数	ハロスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ベンゾピシクロンを含む農薬の総使用回数
3回以内	2回以内	2回以内	3回以内

※移植水稻に使用する場合、散布時の水稻の葉齢が4葉期未満の時は葉害が発生する恐れがあるので使用を避ける。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2022年12月現在の登録内容に基づいています。