


# こんなに大きなクログワイも しっかりたたく!

草丈約30cm

散布前

散布4週間後



無処理(4週間後)



適用拡大で  
さらに  
使いやすく!

水稲用中後期除草剤

## サンパント<sup>®</sup>

1キロ粒剤

体系で使われている一発剤の代わりに使用することで、難防除雑草の問題を解決できる新しいタイプの中期剤です。もちろん従来の中期剤と同様に、一発剤で取りこぼした雑草の防除にも使えます。


●ノビエの3.5葉期まで防除 ●SU抵抗性雑草にも有効 ●難防除雑草に卓効

®は日産化学(株)の登録商標

- ・大きくなったクログワイ、オモダカ、コウキヤガラといった難防除の雑草もしっかり枯らす。
- ・3.5葉期のノビエにも高い効果を発揮。

これにより

- ・初期剤との体系で、より遅くに使用でき、防除の難しいクログワイもしっかり防除。



- ・もちろん、従来の中期剤と同様に、一発剤でとりこぼしてしまった雑草もしっかり除草。

\*登録上は4葉期ですが、抵抗性雑草地域では早めの散布をお願いします。

## ■各有効成分の雑草への効果

殺草効果：◎(極大)、○(大)、△(小)

| 雑草名<br>有効成分                                                                         | 一年生雑草 |         |     |    | 多年生雑草 |     |      |        |        |      |      |      |        |       |    | その他   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|----|-------|-----|------|--------|--------|------|------|------|--------|-------|----|-------|------|
|                                                                                     | ノビエ   | カヤツリグサ科 | コナギ | 広葉 | クログワイ | シズイ | オモダカ | コウキヤガラ | ミズガヤツリ | マツバイ | ホタルイ | ウリカワ | ヘラオモダカ | ヒルムシロ | セリ | アオミドロ | 表層剥離 |
| ハロスルフロメチル                                                                           | △     | ◎       | ◎   | ◎  | ◎     | ◎   | ◎    | ◎      | ◎      | ◎    | ◎    | ◎    | ◎      | ◎     | ◎  | ○     | ○    |
| シハロホップブチル                                                                           | ◎     |         |     |    |       |     |      |        |        |      |      |      |        |       |    |       |      |
| ベンゾビスクロン                                                                            | ○     | ◎       | ◎   | ○  | ○     | ○   | △    | ○      | ◎      | ◎    | ◎    | △    | ◎      | ○     | △  |       |      |
| ジメタメトリン                                                                             | △     | ○       | ○   | ◎  |       |     |      |        |        |      |      |      |        |       |    | ◎     | ◎    |
|  |       |         |     |    |       |     |      |        |        |      |      |      |        |       |    |       |      |
| サンパンチ1キロ粒剤                                                                          | ◎     | ◎       | ◎   | ◎  | ◎     | ◎   | ◎    | ◎      | ◎      | ◎    | ◎    | ◎    | ◎      | ◎     | ◎  | ◎     | ◎    |

## ■各種雑草の散布適期

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| ホタルイ            | 3葉期*まで    |
| ウリカワ            | 4葉期まで     |
| ミズガヤツリ          | 4葉期まで     |
| ヘラオモダカ          | 3葉期まで     |
| ヒルムシロ           | 発生期まで     |
| セリ              | 再生始期まで    |
| オモダカ            | 矢じり葉3葉期まで |
| キシュウスズメノヒエ      | 3葉期まで     |
| クログワイ           | 草丈30cmまで  |
| コウキヤガラ          | 草丈30cmまで  |
| シズイ             | 草丈30cmまで  |
| イボクサ            | 茎長20cmまで  |
| クサネム            | 草丈20cmまで  |
| アオミドロ・藻類による表層剥離 | 発生始期まで    |

## ■適用雑草及び使用方法

| 作物名  | 適用雑草名                                                 | 使用時期                               | 使用量     | 本剤の使用回数 | 使用方法                         |
|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|------------------------------|
| 移植水稻 | 一年生雑草 及び<br>多年生広葉雑草<br>キシュウスズメノヒエ<br>アオミドロ・藻類による表層はく離 | 移植後15日～<br>ノビエ3.5葉期<br>但し、収穫60日前まで | 1kg/10a | 1 回     | 湛水散布<br>又は<br>無人航空機<br>による散布 |
| 直播水稻 | 一年生雑草及び<br>マツバイ<br>ホタルイ<br>ミズガヤツリ<br>ウリカワ<br>ヒルムシロ    | 稲3葉期～<br>ノビエ3.5葉期まで<br>但し、収穫60日前まで |         |         |                              |

| シハロホップブチルを含む農薬の総使用回数 | ジメタメトリンを含む農薬の総使用回数 | ハロスルフロメチルを含む農薬の総使用回数 | ベンゾビスクロンを含む農薬の総使用回数 |
|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 3回以内                 | 2回以内               | 2回以内                 | 3回以内                |

※移植水稻に使用する場合、散布時の水稻の葉齢が4葉期未満の時は薬害が発生する恐れがあるので使用を避ける。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2022年12月現在の登録内容に基づいています。