

土壌処理除草剤だけでは

抑えきれない タフな雑草に!

「イチビ」
「キクイモ」
などに卓効!

飼料用トウモロコシ除草剤


シャド® 水和剤

タフな雑草に強い成分

“ハロスルフロンメチル”配合の茎葉処理除草剤

高品質な飼料生産に
貢献します。

しかも、
適用作物への高い安全性で
全面散布が可能です。



高品質な
飼料生産に
貢献します。

*本資料では「普通物」を「毒劇物に該当しないものを指している通称」として用いています。

特長

① イチビ・キクイモ・ショクヨウガヤツリ（キハマスゲ）に有効

防除が困難で近年問題になっている、強害雑草のイチビ・キクイモ・ショクヨウガヤツリ（キハマスゲ）に高い効果を発揮します。

② 効率的な除草が可能

本剤は、発生後から5葉期までの雑草に有効ですので、雑草の発生をみてからの散布が可能です。効率的でゆとりを持った除草ができます。

③ 高い選択性を持つ

本剤は、対象作物に対して高い選択性を有しているため、全面茎葉散布が可能です。作物にかからないように散布するわずらわしさがありません。

適用雑草の範囲及び使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ハロスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
飼料用 とうもろこし	一年生及び 多年生 広葉雑草	一年生及び 多年生広葉雑草 2～5葉期 (とうもろこし3～5葉期)	50～75 g/10a	100 L/10a	1回	雑草茎葉 散布	1回
	キクイモ	キクイモ生育期 (とうもろこし5葉期)					

上手な使い方（散布時期）

適用作物（使用時期）	適用雑草	使用時期（雑草の葉令等）
飼料用とうもろこし（3～5葉期）	イチビ	使用適期：イチビ 2～5葉期
飼料用とうもろこし（5葉期）	キクイモ	飼料用とうもろこし 5葉期

〈散布器具の洗浄方法〉

*本剤は慣行の土壌処理剤との体系でご使用ください。

散布器具内に残ったシャドー水和剤は、微量で広葉植物の生育に影響を与えることがあります。シャドー水和剤の散布に使用した散布器具は、使用后、タンク、ホース、ブーム、ノズル内に薬液が残らないよう十分に洗浄し、他の作物に使用する場合、薬害の原因にならないよう注意してください。

散布器具の洗浄方法（例：1000Lタンク使用時）

以下の方法で洗浄してください。

1. ノズルおよびタンクのドレイン（排出口）から残った薬剤を完全に排出してください。（薬液は河川、排出溝等へは直接流さないこと。）
2. タンクおよびフタの内側をドレインを開けた状態で流水で約5分間（約100Lの水）タンク内部をていねいに洗浄し、排出してください。
3. タンクに半分まで注水し、家庭用の洗剤を加えてください。エンジンを始動して3分間循環し、ノズルおよびドレインから排出してください。
4. タンクおよびフタの内側を泡がきれるまで、流水で約5分間（約100Lの水）をていねいに洗浄し、排出してください。
5. 再度、タンクを流水で5分間（約100Lの水）をていねいに洗浄し、排出してください。
6. タンクに半分まで注水し、その1/4量をノズルより動力噴霧後、残りをドレインから完全に排出してください。
7. 排水ホース、吸水ホース、ノズルおよび散布器具の外側（薬液の付着した可能性のあるところ全て）を流水で洗浄してください。

〈注意事項〉

(1) 一般的注意事項

- 1) 使用量に合わせ薬液を調整し、使い切ってください。
- 2) 有機リン系殺虫剤との混用及び7日以内の近接散布は、薬害を生ずることがあるのでさけてください。
- 3) 周辺作物、特にてんさいやあぶらな科作物に対して、薬害を生ずるおそれがあるので飛散しないように注意して散布してください。
- 4) 本剤はイネ科雑草に効果が期待できないので、これらの雑草に有効な除草剤との体系で使用してください。
- 5) 使用后、タンク、ホース、ノズル内に薬液が残らないよう散布器具は十分に洗浄し、他の用途に使用する場合、薬害の原因にならないよう注意してください。

(2) 飼料用とうもろこしに使用する場合は、一般的注意事項の他、以下の点に特に注意すること。

- 1) 本剤は飼料用とうもろこし用除草剤で、スイートコーン（加工用、生食用）には薬害を生じる場合があるので、これらには使用しないでください。
- 2) 飼料用とうもろこしで散布数日後、一時的に縞状の退色、生育抑制を生ずることがありますが、その後の生育に影響しません。
- 3) 飼料用とうもろこしで耕作土壌の反転等により、極端に土壌の有機物含量が少ない場合、縞状の退色、生育抑制の薬害を生じる恐れがあるので使用をさけてください。
- 4) 散布直後の降雨によって薬害を生ずる恐れがあるので、天候を見極めて散布してください。
- 5) 通常の輪作体系では後作物に影響はないが、本剤使用后短期間内に飼料用とうもろこし以外の作物の播種はさけてください。
- 6) 適用雑草名キクイモに散布した場合、塊茎が残る場合があるが食用又は飼料用に供しないください。
- 7) 生育初期のキクイモに対しては、効果が劣ることがあります。

粉末は眼に対して弱い刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。●本剤は小児の手の届くところには置かないで下さい。

本資料は2024年2月現在の登録内容に基づいています。

防除日誌を記載しましょう。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号
ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>
お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00～17:30 土日祝日除く)