

田植え同時処理で、長ーく抑える!



田植え当日

田植え 約30日後

田植え 約50日後

「既に生えている雑草に効く成分」と「雑草に長く効く成分」の組合せ。
4成分で、田植え同時処理でも、長期間雑草の発生を抑えます。

水稻用一発処理除草剤

シリウス
イグザ
1キロ粒剤



■ノビエ・広葉とも散布後約50日の残効が期待できます。

®は日産化学(株)の登録商標



**「既に生えている雑草に効く成分」と「雑草に長く効く成分」の組合せ。
4成分で、田植え同時処理でも、長期間雑草の発生を抑えます。**

ピラクロニル

既に生えてしまっている**ノビエ**や**コナギ**、**オモダカ**にも
効果の高い有効成分です。
低成分で活性が高く、効果が持続します。

オキサジクロメホン

ノビエに対し長期間効果が持続する有効成分です。
問題になっている**後発のノビエ**を抑えます。

ベンゾビシクロン


既に生えてしまっている**抵抗性ホタルイ**や**抵抗性広葉雑草**にも効果の
高い有効成分です。効果の持続性にも優れ、後発の雑草も抑えます。

ピラゾスルフロンエチル


クログワイなどの防除が難しい**多年生雑草**を
長期間抑えることができる有効成分です。



■田植え同時処理でも、その効果は長期間持続。




■もちろん通常の移植後処理でも優れた効果。



■本試験では田植え同時処理78日後まで、雑草をしっかり抑えました。



■散布適期



■適用雑草と使用方法

※直播水稲に使用する場合は農薬を避けるため、稲の根が露出している時の使用は避ける。

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草及び、 マツバイ、ホタルイ、 ウリカワ、ミズガヤツリ、 ヘラオモダカ、ヒルムシロ、 セリ、オモダカ、 クログワイ、シズイ、 アオミドロ・藻類による表層はく離	移植時	1kg/10a	1 回	田植同時 散布機で施用
		移植直後～ ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで			湛水散布
直播水稲 [※]	水田一年生雑草及び、 マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、 ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	稲1葉期～ ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで			

オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数	ピラクロニルを含む農薬の総使用回数	ピラゾスルフロンエチルを含む農薬の総使用回数	ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	1回以内	2回以内

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2018年7月現在の登録内容に基づいています。