

入水前、圃場によって 生えてくる雑草は違う。

乾田
直播水稻
向け



ノビエも! オオクサキビも! クサネムも! まとめて枯らす。

スタムなら、乾田直播水稻で
枯れ残ってしまいがちな
問題雑草も、しっかり枯殺。
だから、圃場ごとに薬剤を
使い分ける必要がありません。

速効タイプの入水前茎葉処理除草剤


スタム 乳剤35

スタムは乾田直播の問題雑草も、入水前にまとめて枯らします。

スタム乳剤は乾田直播の入水前に使う、速効タイプの茎葉処理除草剤です。
雑草の生育初期に使うことで、ノビエ、オオクサキビ、クサネムなどの問題雑草もしっかり枯らせます。
そのため、圃場ごとに発生する雑草が違うからといって、薬剤を変える必要がありません。


枯れ残りやすい「ノビエ」「オオクサキビ」「クサネム」もしっかり枯らす！

■ ノビエ・オオクサキビに対する効果



2015年 日産化学(株)生物科学研究所 温室試験
処理条件:畑地条件 薬量:1000mℓ/10a
草種(処理時葉齢):ノビエ(2, 2.5, 3葉期)、オオクサキビ(2.5, 3葉期)
調査時期:処理23~26日後

■ クサネムに対する効果



2018年 日産化学(株)社内試験 岡山県岡山市圃場
処理条件:乾田期
薬量:スタム乳剤 800mℓ/10a、対照剤A 1,000mℓ/10a
処理時葉齢:草丈 ~10cm (~3.2葉期)
調査時期:処理28日後

雑草の生育初期に使うことで、幅広い種類の雑草を枯らせます！

■ 葉齢限界

イネ科雑草	イヌビエ	3葉期
	オオクサキビ	3葉期
	オオニワホコリ	4葉期
	アゼガヤ	4葉期
	メヒシバ	4.5葉期
広葉雑草	スズメノテッポウ	2葉期
	クサネム	3葉期
	ホソアオゲイトウ	3葉期
	カヤツリグサ	3.5葉期
	イヌタデ	3葉期
	アメリカセンダングサ	3葉期
	スベリヒユ	1葉期

2015, 2018, 2019年 保土谷UPL(株)/日産化学(株) 温室試験
1000~1100mℓ/10a

■ 使用時期

使用時期は、稲出芽始め以降ノビエ3葉期までです。

※土壌処理剤や非選択性茎葉処理除草剤との体系でご使用ください



■ 適用雑草と使用方法

本剤及び、その有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		使用方法	総使用回数#
			薬量	希釈水量		
直播水稻	一年生雑草	稲出芽始期~ノビエ3葉期 但し、収穫90日前まで	550~1100mℓ/10a	50~100ℓ/10a	乾田・落水状態で 雑草茎葉散布 又は 全面散布	本剤 1回 プロパニル剤 1回

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2022年10月現在の登録内容に基づいています。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号
ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>
お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00~17:30 土日祝日除く)