

幅広い作物に！

FMC

キルメキの「テラスタ」、
キルメキの効果。



日産 果樹・野菜・茶害虫の同時防除に

テラスタ[®]
水和剤

きらめきのニュースター、 ときめきの効果。



®:米国FMC社の登録商標

★特 長

1 幅広い効果
果樹、野菜、茶などの主要害虫を同時防除できます。

2 すばやい効果
速効性にすぐれ、散布直後から強い殺虫作用を示します。また特異な忌避作用があります。

3 すぐれた残効性
効果の持続期間が長く、少ない散布回数で高い防除効果が得られます。

4 ハダニにも有効
ハダニ類にも効果があり、ハダニ類のリサージェンス(異常増殖)が起こりにくいビレスロイド剤です。

成分:ビフェントリン…2.0% 毒性:普通物※
※毒劇物に該当しないものを指している通称

★適用害虫と使用方法

*本剤およびビフェントリンを含む農薬の総使用回数

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	10アール当り 散 布 液 量	使用時期	総使用回数*
りんご	モモシクイガ、ハマキムシ類、キンモンホソガ、アブラムシ類、 ギンモンハモグリガ、リンゴハダニ、ナミハダニ	1,000	200～700ℓ	収 穫 前 日 ま で	1回
なし	シンクイムシ類、ハマキムシ類、ナシチビガ、アブラムシ類、ハダニ類	1,000～2,000			収 穫 14 日 前 ま で
もも	カメムシ類			1,000	
もも	モモハモグリガ、アブラムシ類、カメムシ類	1,000～2,000			
かき	カメムシ類、チャノキイロアザミウマ	1,000		収 穫 前 日 ま で	本剤1回 ビフェントリン2回 (散布は1回、くん煙は1回)
かき	カキクダアザミウマ、ハダニ類、カキノヒメヨコバイ	1,000			
ぶどう	チャノキイロアザミウマ	1,000	200～700ℓ	収 穫 14 日 前 ま で	2回
びわ	アブラムシ類、オオタバコガ、カメムシ類	1,000～2,000			
かんきつ	カメムシ類、ミカンハモグリガ、チャノキイロアザミウマ	1,000	150～300ℓ	収 穫 前 日 ま で	3回
ハスカップ	アブラムシ類				
すいか	アブラムシ類、ハダニ類	1,000	150～300ℓ	収 穫 前 日 ま で	1回
メロン	アブラムシ類、ハダニ類、タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む)				
きゅうり	アブラムシ類、オンシツコナジラミ	1,000	150～300ℓ	収 穫 前 日 ま で	4回
なす	アブラムシ類、オンシツコナジラミ、ハダニ類				
ねぎ	シロイチモジヨトウ	1,000～1,500	100～300ℓ	収 穫 7 日 前 ま で	2回
キャベツ、はくさい	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、アブラムシ類				
だいこん	アブラムシ類	1,000～1,500	100～300ℓ	収 穫 21 日 前 ま で	4回
ばれいしょ					
パセリ	アブラムシ類、インゲンマメゾウムシ	1,000	100～300ℓ	収 穫 3 日 前 ま で	2回
いんげんまめ	アブラムシ類				
だいず	アブラムシ類	250	25ℓ	収 穫 7 日 前 ま で	3回
てんさい	ヨトウムシ				
てんさい	カメノコハムシ	1,500	100～300ℓ	収 穫 7 日 前 ま で	4回
てんさい	ハダニ類	1,000			
茶	チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、チャノホソガ、チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ、カンザワハダニ、ヨモギエダシャク	1,000	200～400ℓ	摘採14日前まで	2回
あずき	フキノメイガ	1,500	150～300ℓ	収 穫 7 日 前 ま で	3回
ばら、きく、カーネーション	ハダニ類	1,000			
たばこ	ヨトウムシ、アブラムシ類、オンシツコナジラミ	1,500	25～180ℓ	収 穫 10 日 前 ま で	2回

*テルスター水和剤は上記の他に、芝、ホップ、あけび(果実)、樹木類に登録があります。

※使用方法:散布

⚠ 使用上の注意(抜粋)



- 蚕に対して長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、桑に付着する恐れのある場所では使用をさけてください。
- 本剤の散布の際に着用していた衣服は、養蚕作業に用いるものと区別してください。
- ミツバチに対して影響があるので、次の事項に注意してください。
 - ・ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - ・受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
 - ・関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- ※ばら、きく、カーネーションに使用する場合、収穫間際の散布は葉や花に汚れを生じる場合があるのでさけてください。

①使用前にはラベルをよく読んでください。 ②ラベルの記載以外には使用しないでください。 ③本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2018年10月現在の登録内容に基づいています。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号
ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>
お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00~17:30 土日祝日除く)

TAL-WHS14A