

畑作&野菜 雑草防除の定番!

総合・粒剤



麦類
直播水稻
陸稲

麦類・稲



だいず、えだまめ、
あずき、らっかせい、
さやいんげん

豆類



トレファノ魔人

ばれいしょ、かんしょ、
さといも、さといも(葉柄)、
やまのいも、やまのいも(むかご)、
こんにゃく、にんじん、
たまねぎ、にんにく、らっきょう、
しょうが、葉しょうが、みょうが

根菜類

キャベツ、はくさい、
ブロッコリー、なばな、
みずな、レタス、
非結球レタス、ねぎ、
わけぎ、あざつき

葉菜類



すいか、漬物用すいか、
メロン、漬物用メロン、
かぼちゃ、とうがん、
きゅうり、トマト、
ミニトマト、なす

果菜類

製品情報は
こちら ⇨



畑作用除草剤 広く長く使われているのには理由がある

トレファノサイド® 粒剤2.5

姉妹品の
乳剤も
よろしく!

トレファノサイド®はゴーワン クロップ プロテクション社の登録商標です

■適用作物と使用方法 *収穫物への残留回避のため、本剤及びトリフルラリンを含む農薬の総使用回数の制限を示す。

適用雑草:一年生雑草(ツクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)ただし、直播水稻ではノビエのみ

使用方法:全面土壌散布(うね間土壌散布、うね間・株間土壌散布は「使用時期」内に表記) ※かんしよ挿苗後雑草発生前の場合は「全面土壌散布」または「うね間土壌散布」

作物名			使用時期	使用量 (kg/10a)	総使用 回数*
稲・麦	直播水稻*1		乾田直播の播種後出芽前 (ノビエ発生前) (入水15日前まで)	4～5	1回
	陸稲		播種後出芽前	4	
	麦類*2	播種後出芽前～3葉期 (雑草発生前～雑草発生始期) (雑草茎葉散布または全面土壌散布)		4～5	2回
		生育期雑草発生前 ただし、収穫45日前まで			
豆類	だいず えだまめ*3		播種後出芽前	4～6	2回 (本剤1回) (全面土壌混和、 散布 合計1回) (うね間1回)
			定植前(植穴掘前)		
			生育期(うね間) ただし、収穫45日前まで		
	あすぎ*4		播種後出芽前	3～6	1回
	らっかせい				
	さいいんげん	露地栽培	播種直後	4～6	
露地・マルチ栽培		播種前(マルチ前)			
いも類	ばれいしょ		植付後～萌芽前	4～5	3回 本剤(挿苗前1回) 剤(挿苗後2回)
	かんしょ		挿苗前雑草発生前	3～4	
	挿苗後(活着前)は 全面土壌散布、 生育期(活着後)は うね間土壌散布		挿苗後雑草発生前 (全面土壌散布またはうね間) ただし、収穫60日前まで		
	さといも		植付後 ただし、植付7日後まで	4～6	1回
	さといも(葉柄)		植付後(マルチ前) ただし、植付7日後まで		
	やまのいも やまのいも (むかご)		植付直後 生育初期(うね間) ただし、植付30日後まで		
	こんにゃく		植付直後、 中耕培土直後(萌芽前)		
	にんじん		播種直後		1回
根菜類	たまねぎ(本畑)		定植前(植穴掘前) 定植後ただし、収穫75日前まで 生育期(春期)(うね間) ただし、収穫75日前まで	4～5	2回
	らっきょう (露地栽培)		植付後、春期雑草発生前 ただし、収穫120日前まで	5	
	にんにく		植付後、春期中耕除草後 ただし、収穫90日前まで 植付前		
	しょうが、葉しょうが		植付直後	6	
	みょうが	花穂	萌芽前(雑草発生前)		
		茎葉	萌芽前(根株養成圃) (雑草発生前)		
	葉菜類	キャベツ	移植栽培	定植前(植穴掘前)	4～6
はくさい		移植栽培	定植前(植穴掘前)	3～5	
		直播栽培	播種直後		
ブロッコリー(移植栽培)		定植前(植穴掘前)	4～6		
なばな		移植栽培	定植前(植穴掘前)	4	
		直播栽培	播種直後		
みずな(直播栽培)		3			
レタス 非結球レタス	トンネル・ マルチ栽培	定植前 (植穴掘前) (マルチ前)	3～4		

作物名		使用時期	使用量 (kg/10a)	総使用 回数*	
葉 菜 類	ねぎ、わけぎ あさつき		定植後雑草発生前 ただし、収穫30日前まで	4～5	2回
	すいか(トンネル・ マルチ栽培)		定植前(植穴掘前) (マルチ前)	2～4	
果 菜 類			収穫45日前までの生育期 (トンネル除去前)(うね間)	4～5	1回
	漬物用すいか (トンネル・マルチ栽培)		定植前(植穴掘前) (マルチ前)	2～4	
	メロン (露地栽培(トンネル・ マルチ栽培))		定植前(植穴掘前) (マルチ前)	2～3	2回
			収穫45日前までの生育期 (トンネル除去前)(うね間)	4～5	
	漬物用メロン (露地栽培(トンネル・ マルチ栽培))		定植前(植穴掘前) (マルチ前)	2～3	1回
	かぼちゃ (トンネル・マルチ栽培)		定植前(植穴掘前) (マルチ前)	2	2回
			収穫45日前までの生育期 (トンネル除去前)(うね間)	4～5	
	とうがん	露地栽培	収穫45日前までの生育期 (うね間)	5	
		トンネル栽培			
	きゅうり *5	露地栽培(移植栽培)	定植前(植穴掘前)	3～4	
		露地栽培(直播栽培)	播種直後		
	トマト(露地栽培)		定植前(植穴掘前)	4～5	1回
ミニトマト(露地栽培)					
なす(露地栽培)		定植直後(うね間)			
特 用 作 物	ゆうがお		定植キャップ後 (雑草発生前) ただし、収穫75日前まで	4～6	3～4
	たばこ		大土寄直後(うね間)	4	
	たばこ (折衷マルチ栽培)		秋期施肥畦立時マルチ前 (植付3～5か月前)	3～4	2回
	茶		1番茶発芽前、 摘採後(雑草発生前) ただし、摘採40日前まで	4～6	
	桑(本畑)		桑発芽前、春切後、夏切後 (雑草発生前)		
	なたね		播種直後	4～5	
そ の 他	さんしょう(葉)		定植後雑草発生前 ただし、定植7日後まで	5	1回
	樹木類		植付後、生育期 (雑草発生前)(うね間・株間)	4～5	2回
	樹木等*6		雑草発生前	4～6	3回

- *1:乾田状態で全面土壌散布
*2:適用土壌は砂壤土～埴土、適用地帯は全域
(ただし、「大麦」と「生育期処理」は北海道を除く)
*3:適用土壌は砂壤土～埴土、適用地帯は全域(北海道を除く)
*4:適用地帯は全域(北海道を除く)
*5:適用土壌は埴土～埴土
*6:適用場所は公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等
植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布

●使用前には、ラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2023年4月現在の登録内容に基づいています。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号 ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>
お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00～17:30 土日祝日除く)