



日産 ばれいしょ疫病用殺菌剤 ホライズン®

ドライフロアブル

®:「ホライズン」は日産化学(株)の登録商標

ばれいしょの
夏疫病

シモキサニル・ファモキサドン水和剤

- 1.疫病に確実な効果
- 2.雨に強く長く効く
- 3.使い易い顆粒製剤

少量散布*も
できます！
(*400倍、25ℓ/10a)



ホライズン処理



A水和剤




無処理



無人航空機にも対応！

雨降る前でも ホライズン！

ばれいしょ疫病を確実防除



ホライズン®ドライフロアブルはコルテバ・アグリサイエンス社の有効成分、シモキサニルとファモキサドンを含有しています。

日産 ばれいしょ疫病用殺菌剤 ホライズン®ドライフロアブル

製品情報は
↓コチラ↓



農林水産省登録 第20354号

殺菌剤分類 27.11

シモキサニル……30%

ファモキサドン……22.5%

人畜毒性……普通物*

*毒劇物に該当しないものを指している通称

特 長

1.疫病に確実な効果

予防効果の高いファモキサドンと感染直後でも有効なシモキサニルの2種混合により確実な防除が可能です。

2.雨に強く長く効く

成分が速やかに葉にしみこむため雨に強く、長い残効が期待できます。

3.使いやすい顆粒製剤

顆粒製剤(ドライフロアブル)なので粉立ちが少なく、薬液調製も簡単です。




適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	10アール当りの散布液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シモキサニルを含む農薬の総使用回数	ファモキサドンを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	夏疫病	1,500	100ℓ ～ 300ℓ	収穫14日前まで	4回以内	散布 無人航空機による散布	4回以内	4回以内
	疫病	※1,000～2,500						
		400	25ℓ					
		40	3.2～8ℓ					
		20	1.6～4ℓ					

※1,500倍の散布をおすすめします。

(2022年7月現在の登録内容)


ばれいしょ・疫病に対する効果



平成9年 北海道中央農試
萌芽期:6/7 開花期:7/5
散布:7/9、7/30、8/14
初発:8/12

■ ホライズンドライフロアブル 1,500倍
■ (対照) A水和剤 1,500倍
■ 無処理

ばれいしょ・疫病に対する耐雨性



平成10年 日産化学(株)
生物科学研究所
降雨処理:薬剤処理24時間後、
20mm/時間×1時間
接種方法:降雨処理、
自然乾燥後

■ ホライズンドライフロアブル (実用濃度:1,500倍)
■ (対照) A水和剤 (実用濃度:1,500倍)

上手な使い方

本剤は1500倍散布をおすすめします。

1

本剤は発病前(降雨前)の予防散布が最も効果的です。

2

疫病は降雨によって感染しますので、天気予報等を参考にした確防除に努めましょう。

3

使用上の注意

- 石灰硫黄合剤やボルドー液等アルカリ性農薬との混用はさけてください。
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合は直ちに石鹸でよく洗い落としてください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

包装: 1kg×10袋



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号
ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>
お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00～17:30 土日祝日除く)

取扱い

HRZ-FHB9AH