

10葉期でヒエもバッサリ枯らす!



※10葉期は、だいずでの使用の場合。それ以外は6葉期、または8葉期。

イネ科雑草対象茎葉処理除草剤



500mℓ

10葉期のヒエも

イネ科雑草対象茎葉処理除草剤



※10葉期は、だいずでの使用の場合。それ以外は6葉期、または8葉期。

だから、天候不順などで作業に遅れが生じても大丈夫。



ポルトの特長

- ▶6~10葉期の大きな一年生イネ科雑草もバッサリ!
- シバムギ・レッドトップにも250ml/10aで十分 な効果。
- 雑草の枯れが速く、バッサリ枯れる茎葉処理除 草剤です。
- 登録作物に安全性が高く、安心してお使いいた だけます。

使用目的と使用方法 (北海道)

※本剤およびキザロホップエチルを含む農薬の総使用回数の制限を示す。

		(40)母起/		※ 本用 43 & O へ り ロ か ク ノ エ ノ ル を 占			
作物名		適用雑草名	使用時期	10アール当たり使用量		総使用回数*	使用方法
適	だいず	ー年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを 除く)	雑草生育期 (イネ科雑草の3~10葉期)収穫30日前まで	薬量 - - 200∼300mℓ	希积水量 通常散布 50~100ℓ 少量散布 25~50ℓ	2回以内	雑草茎葉散布 または 全面散布
用	そば		雑草生育期 (イネ科雑草の3~6葉期)収穫14日前まで			10	
拡	ブロッコリー		雑草生育期 (イネ科雑草の3~6葉期)収穫7日前まで				
大	ごぼう		雑草生育期 (イネ科雑草の3~8葉期)収穫30日前まで		100 <i>l</i>		
	てんさい	シバムギ レッドトップ	雑草生育期 (イネ科雑草の3~6葉期)収穫30日前まで	250~300ml	100ℓ	2回以内	雑草茎葉散布 または 全面散布
	たまねぎ	ー年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを 除く)	雑草生育期 (イネ科雑草の3~8葉期)収穫30日前まで	200~300ml			
	えだまめ		雑草生育期 (イネ科雑草の3~8葉期) 収穫14日前まで			10	
	あずき いんげんまめ		雑草生育期 (イネ科雑草の3~8葉期)収穫50日前まで				
	ばれいしょ		雑草生育期 (イネ科雑草の3~8葉期)収穫前日まで				
	やまのいも		雑草生育期 (イネ科雑草の3~8葉期)収穫7日前まで				
	にんじん		雑草生育期 (イネ科雑草の3~8葉期)収穫45日前まで				
	だいこん		雑草生育期 (イネ科雑草の3~8葉期)収穫14日前まで				
	キャベツ		雑草生育期 (イネ科雑草の3~8葉期)収穫30日前まで	200ml 200~300ml			
	はくさい		雑草生育期 (イネ科雑草の3~8葉期)収穫21日前まで				
	なたね		雑草生育期 (イネ科雑草の3~6葉期)収穫75日前まで			2回以内	

<u> ⚠ 効果・薬害などの注意事項(抜粋)</u>

- ●本剤の使用に当たっては展着剤の加用は必要ありませんが、てんさいに使用する場 合は本剤に登録のある展着剤を使用してください。
- ●広葉雑草及びカヤツリグサ科には効果が期待できないので、イネ科雑草優占圃場 で使用してください。なお、広葉雑草などが混在する場合は、これらの雑草に有効な 土壌処理型除草剤との体系で使用してください。
- ●雑草茎葉にかかるよう散布してください。
- ●イネ科雑草を完全に枯殺するまでに約1週間を要するので、誤ってまき直しなどしな
- いように注意してください。
- ●冬期の低温時や出穂期以降など、雑草の生育が停止している場合には、効果が劣 ることがあるので使用をさけてください。
- ●少量散布(25~50ℓ/10a)の場合は専用ノズルを使用してください。
- ●イネ科作物には薬害があるので、周囲にイネ科作物がある場合は、薬剤が飛散しな いように注意して散布してください。
- ●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2024年4月現在の登録内容に基づいています。



東京都中央区日本橋二丁目5番1号

ホームページ https://www.nissan-agro.net/ お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00~17:30 土日祝日除く)