

水稲用**初期**除草剤

農薬登録番号：第20826号
有効成分：ブタクロール/10.0%
人畜毒性：普通物※
※本資料では「普通物」を「毒劇物に該当しないものを指している通称」として用いています。

マーシエット[®]1キロ粒剤

ノビエをはじめホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、マツバイまで
広範囲の雑草に優れた効果を示し、長期間持続します。



使い方

散布時期：雑草の発生前から発生始期に有効ですので、ノビエの1葉期までに時期を失ないように散布してください。


散布量：10アール当り1 kg(1袋)均一に散布してください。

※ホタルイ、ミズガヤツリは発生始期まで、ヘラオモダカ、コナギは発生前に散布してください。

本剤は雑草の発芽・発生前から発生の極初期の処理で有効です。
そのため早めの処理で安定した効果を発揮します。

■水田雑草に対する処理時期別の効果(対無処理区比)

(財)日本植物調節剤研究協会依託試験成績(平成11,12,13年度)



雑草の発生前に使用すると効果が安定します。



近年問題となっているSU抵抗性ホタルイ、アゼナ、ミズアオイ、コナギなどにも優れた効果を発揮します。

SU抵抗性ホタルイに対する効果

(財)日本植物調節剤研究協会研究所(平成12年度)

薬剤名	処理時期	薬量 (kg/10a)	残草量(対無処理区比%)								
			北海道産(SU抵抗性)			宮城県産(SU抵抗性)			牛久産(SU抵抗性)		
			処理後日数			処理後日数			処理後日数		
			10日	20日	30日	10日	20日	30日	10日	20日	30日
マーシェット1キロ粒剤	発生前	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	発生始	1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

残草量： ● 0% ◎ 0～1% ○ 1～10% ○ 10～20%



登録内容

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ブタクロールを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ヘラオモダカ	移植時	1kg/ 10a	1回	田植同時 散布機 で施用	2回以内
		植代後～移植前7日 又は 移植直後～ノビエ1葉期 ただし、移植後30日まで			湛水散布	

※本資料は2018年7月現在の登録内容に基づいています。


使用上の注意

- 苗の植付が均一になるよう、整地、代かきはていねいに行うこと。
- 散布の際は通常の湛水深(3～5cm)でまきむらを生じないように均一に散布し、散布後3～4日はそのままの湛水状態を保つこと。また、散布後7日間は落水、かけ流しはしないこと。



- 低温で長期にわたり雑草が発生する地域、代かきから移植までの期間が長い場合においては、移植後に使用する除草剤との体系で使用する。

- 以下の水田では初期生育の抑制を生じる恐れがあるので使用を避けること。



- 浅植えや植付精度不良などで根が露出していると、薬害を生ずる恐れがあるので注意すること。
- 散布数日以内の梅雨明けなどによる異常高温では、初期生育が抑制されるおそれがあるので使用しないこと。
- 活着遅延を生ずるような異常低温では、初期生育の抑制が生じるおそれがあるので、病害虫防除所等関係機関の指導を受けること。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号
ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>
お客様窓口 TEL.03-4463-8271(9:00～17:30 土日祝日除く)