



除草効果が

長く続く

乾田直播水稻用除草剤

だから、その後の雑草防除が楽になります!!

マーシエット乳剤

乾田時期の
雑草防除に

〈乾田直播水稻用除草剤〉

“播種直後～稲出芽前”に使用すれば、乾田時期の
雑草の発生を抑え、次の雑草防除を楽にします。



マーシエット乳剤
5ℓ入り

マーシエット乳剤なら
除草効果が持続します!

(写真は散布26日後)

乾田直播除草試験

(2016年 富山県八尾町〈社内試験〉)

品種：コシヒカリ

は種：2016年4月22日

散布：2016年5月1日(イネ出芽前)

薬量：マーシエット乳剤1000mℓ/10a

ラウンドアップマックスロード500mℓ/10aと混用

〈乾田直播水稲用除草剤〉

マーシエット乳剤

乾田時期の
雑草防除に

登録番号：農林水産省登録第20131号

有効成分：ブタクロール … 32.0%

容量：5ℓ入り



除草効果が長く続く 乾田直播水稲用除草剤

だから、その後の雑草防除が楽になります!!

“播種直後～稲出芽前”に使用すれば、乾田時期の雑草の発生を抑え、次の雑草防除を楽にします。

播種

出芽

入水

←マーシエット乳剤の使用時期→

散布適期
出芽1～2週間前

除草効果

もし散布時に雑草が生えていれば
“ラウンドアップマックスロード”との混用*も可能。
生えている雑草も枯らし、しかも後から生えてくる
雑草も抑えることができます。

*現地地の指導機関に確認してください。



希釈水量25～50ℓ/10aの場合はマーシエット⇒ラウンドアップマックスロードの順で混用してください。逆にすると凝集します。

適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ブタクロールを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
移植水稲	一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ	植代直後 (移植7日前まで) 又は 移植後1日～ノビエ1葉期 ただし、移植後30日まで	300～500 mℓ/10a	—	1回	原液湛水 散布	2回以内
直播水稲	一年生雑草	乾田直播の は種直後～稲出芽前 (雑草発生前) (入水15日前まで)	1000～1500 mℓ/10a	通常散布 50～100ℓ/10a 少量散布 25～50ℓ/10a	1回	全面土壌 散布	2回以内
	一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ	乾田直播の 入水10～2日前	500 mℓ/10a	通常散布 50～100ℓ/10a 少量散布 25～50ℓ/10a	1回	全面土壌 散布	2回以内

オススメ
します!

(注意事項)

- 効果安定のため、碎土を細かくしてください。
- 碎土が粗い場合、散布時の土壌が極端に乾燥している場合、雑草が既に発生している場合には、効果が劣る場合があります。
- 散布直後に大雨が降った場合や水はけの悪い圃場では稲の出芽や生育が不良になる場合があります。
- 薬液が直接種籾にかかると薬害を起こす可能性があるため、覆土は確実に行ってください。
- 少量散布 (25～50ℓ/10a) の場合は、専用ノズルを使用してください。

● 使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ● ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ● 本剤は小児の手の届くところには置かないで下さい。

本資料は2021年4月現在の登録内容に基づいています。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号

ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>

お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00～17:30 土日祝日除く)

MAC-EHR3A