

ハダニ類に優れた効果



アスパラガスに使えるようになりました!

有用昆虫・天敵にやさしい

マイトコーネ®
フロアブル





有用昆虫・天敵にやさしい

農林水産省登録
第20448号

マイトコーネ[®]フロアブル

人畜毒性：普通物*

成分：ピフェナゼート…20%

*毒劇物に該当しないものを指している通称

特長

1. 各種のハダニ類の成虫・幼虫に効果が高く、卵にも有効です。
2. 有用昆虫（ミツバチ、マメコバチ等）や天敵（カブリダニ、ハネカクシ等）に対して影響が少ない薬剤です。
3. 適用作物が広く、汎用性の高い殺ダニ剤です。

使用 上手 方

- かけむらのないよう葉の表裏にていねいに十分量散布してください。
- ハダニの発生初期に散布してください。
- 年1回散布を徹底し、他剤とのローテーションで使用してください。

適用害虫と使用方法

※本剤およびピフェナゼートを含む農薬の総使用回数の制限

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (ℓ/10アール)	使用時期	総使用 回数※	使用 方法
かんきつ	ミカンサビダニ ミカンハダニ	1000~1500	200~700	収穫7日前まで	1回	散布
りんご	ナミハダニ リンゴハダニ	1000		収穫前日まで		
なし	ハダニ類	1000~1500		収穫7日前まで		
もも	モモサビダニ	1000~1500		収穫3日前まで		
いちじく	ハダニ類			収穫14日前まで		
あけび(果実)				収穫21日前まで		
マンゴー						
アテモヤ						
かき						
ネクタリン						
小粒核果類						
おうとう						
ぶどう	ブドウサビダニ				2回	
いちご	ハダニ類	1000	100~300	収穫前日まで	1回	散布
すいか、メロン						
きゅうり、なす						
ピーマン						
トマト	ハダニ類 トマトサビダニ	1500	100~300	収穫3日前まで	1回	散布
ミニトマト						
さといも、やまのいも	ハダニ類	1000	100~300	収穫前日まで	1回	散布
かんしょ						
しそ科葉菜類(えごま(葉)を除く) しそ(花穂)	アスハラガス	1000	100~300	収穫前日まで	1回	散布
アスハラガス						
茶	カンザワハダニ チャノナガサビダニ	1000	200~400	収穫前日まで 摘採14日前まで 同じ遮光する栽培では 遮光開始14日前まで	1回	散布
食用ミニバラ	ハダニ類 ナミハダニ	1500	100~300	収穫前日まで	1回	散布
さく						
りんどう	ハダニ類	1000	100~300	開花前まで	1回	散布
げっきつ						
しよくようほおずき						
みょうが(花穂)						
みょうが(茎葉)				みょうが(花穂)の 収穫前日まで *2		散布
さんしょう(葉)		1500		収穫14日前まで		

*1 花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する。

*2 花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで。

※なしに使用する場合は、「新高」では8月に入ってから使用してください。早生および中生の品種では8月中旬以降にしてください。

⚠ 使用上の注意事項

- ボルドー液との混用および14日以内の近接散布はさけてください。
- 本剤は植物体への浸透移行性がないので、かけ残のないよう葉の表裏に十分に散布してください。
- ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布むらのないようていねいに散布してください。
- もものモモサビダニに対して使用する場合、多発生では効果が劣ることがあるので注意してください。
- 食用ミニバラにはじめて使用する場合及び新品種にはじめて使用する場合、使用者の責任において事前に薬効、薬害を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 茶に使用する場合、遮光する栽培とは茶を被覆するすべての栽培方法を指すので注意してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- ハダニ類は薬剤抵抗性が発達しやすいので年1回使用とし、作用性の異なる他の薬剤との輪番で使用してください。(抵抗性回避)

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。



ナミハダニ



カンザワハダニ



ミカンハダニ



リンゴハダニ

本資料は2019年10月現在の登録内容に基づいています。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号
ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>
お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00~17:30 土日祝日除く)