

イネ科雑草も広葉雑草もこの1剤で。

®は日産化学(株)の登録商標

日産

畑作用土壤処理除草剤

ラクサー[®] 乳剤

リニュロンが広葉雑草に効く!

アラクロールがイネ科雑草に効く!



ツユクサ
にも効く!



ラクサーなら、2つの有効成分でワイドにカバー!!

雑草名 有効成分	イネ科					広葉								
	ノビエ	メヒシバ	オヒシバ	エノコログサ	カヤツリグサ	シロザ	タデ類	ハコベ	スペリヒュ	イヌホオズキ	ホシアオゲイトウ	イヌビュ	ハキダメギク	ツユクサ
アラクロール	◎	◎	◎	◎	◎	□	○	◎	◎	○	○	□	○	◎*
リニュロン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	□

ラクサー乳剤

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○*

*2成分の混合効果による。 *800ml/10a散布の場合。

殺草効果: (◎)(極大)、(○)(大)、(□)(中)、(△)(小)、(×)(無)

2つの有効成分でイネ科も広葉もしっかり抑えます!

アラクロールが


イネ科雑草に



リニュロンが

広葉雑草に

幅広い雑草をもれなく、より確実に枯らします。



試験結果

平成18年 日植調研究所

■ 試験結果
ラクサー乳剤 500mL
A乳剤 500mL

作物:大豆(タチナガハ)
播種日:5月25日
処理時期:5月25日
調査日:51日目

適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	アラクロールを含む農薬の総使用回数	リニュロンを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量				
だいす えだまめ	一年生雑草	は種後出芽前 (雑草発生前)	400~800mL /10a	100ℓ /10a	1回	全面土壤散布	1回	2回以内 (全面土壤散布は1回以内、 雑草茎葉兼土壤散布は 1回以内)
			400~600mL /10a					
ばれいしょ		植付後萌芽前 (雑草発生前)						1回

△ 使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。
- 発芽後の雑草に対しては効果が劣るので、雑草発生前に時期を失しないように散布してください。
- 破壊、整地はていねいに行い、種子が露出しないように覆土はできるだけていねいに行い、覆土深を2~3cm以上してください。
- 土壤が極端に乾燥している場合には効果が劣るので、土壤が適度の水分を含んでいるときに使用してください。
- 水はけの悪い圃場及び過湿条件では薬害のおそれがあるので使用をさけてください。
- 敷布後に多量の降雨が予想される場合には薬害を生じるおそれがあるので使用をさけてください。
- 砂土では使用しないでください。
- 砂質土の保水力の小さい圃場では使用しないでください。
- 蚊に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかかるないようにしてください。
- 周辺農作物や有用植物に薬害を生じるおそれがあるので、飛散しないように注意して散布してください。特に風の強い時の散布はさけてください。
- 使用後は、タンク、ホース、ノズル内に薬液が残らないよう散布器具は十分に洗浄し、他の用途に使用する場合には薬害の原因にならないよう注意してください。
- 本剤は自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかかるないように注意してください。
- 空容器等は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

●いんげんまめに使用する場合、品種によっては薬害を生じるおそれがあるので、金時類(白金時類は除く)、中長うずら類以外の品種では使用しないでください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2019年3月現在の登録内容に基づいています。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号

ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>

お客様窓口 TEL.03-4463-8271(9:00~17:30 土日祝日除く)