

あのレブラスが、 ドローンで撒ける！ 「エアー粒剤」ついに登場！

AVH-301



多年生雑草に強い！
「アルテア」増量配合*



ホタルイ、ノビエ、クログワイ、オモダカ……
問題雑草の取りこぼしも、難なく一掃！
プレミアム中後期除草剤レブラスから
ドローン向け「エアー粒剤」、ついに登場！

水稲用 中後期除草剤

レブラス[®] エアー粒剤

●ミズアオイ、クサネム、コナギ、イボクサなどの
主要雑草もしっかり枯らします。

※アルテアはメタソルスフロン愛称です。 *当社「アルテア」配合一発剤との比較。

®は登録商標

レブラス[®] エアー粒剤

製品情報は
こちら↓



登録番号：第24221号
有効成分：ジメタメトリン……………2.5%
 ダイムロン……………25.0%
 テフリルトリオン……………7.5%
 メタゾスルフロン……………3.0%
容 量：1.2kg入(30アール分)

レブラス エアー粒剤の特長

- 除草成分「アルテア」*を増量配合*! 殺草力がアップ。
- 枯れ残って大きくなってしまった雑草もしっかり枯らします。
- ドローン散布に適した自己拡散型の製剤です。

・幅30mまでは圃場の中央に散布するだけで拡がるので作業時間を短縮できます。
・ラフに撒いても拡がるので飛行ルートを気にする必要ありません。

*アルテアはメタゾスルフロンの愛称です。*当社一発剤比



多年生雑草に強い!
「アルテア」増量配合*

ドローン向けに開発した『レブラス』です。

ドローンによる散布法


● 圃場周辺への飛散防止と薬剤を十分拡散させるために、以下の条件を守って散布してください。

〈散布条件〉

飛行高度：2~3m 風速：3m/秒以下
畦畔からの距離：10m以上 水深：5cm以上

〈散布幅〉

30m以下*
(片側15mまで拡散します)



エアー粒剤

拡散性粒剤なので、
ラフに撒いても大丈夫!

● 推奨散布方法

*藻、浮草、表層剥離が発生している場合は適宜、散布幅を狭めてください。

機 体	散布装置	飛行速度	インペラ 回転数	開度 (ポリウム)	吐出時間 秒/10a	散布距離 m/10a	散布幅	30×100m圃場の 飛行ルート
AGRAS T10 AGRAS T30	GS110(T) GS440(T)	15km/時	600 rpm	23.6%	6.5	27	30m以下* (片側15m以下)	圃場中央 片道1回* (81m)
MG-1 MG-1K T20 T20K	GS110 GS110K GS220 GS220K			40%	19	80		圃場中央 約1.5往復 (240m)
YMR-08	GR1-10 標準ローラー		95	26	107	圃場中央 約2往復 (321m)		
	GR1-10 ひし形ローラー		60	19	80	圃場中央 約1.5往復 (240m)		
ZionAC940 MMC940AC ZionAC1500 MMC1500AC	ZIN700P ZIN1400G		固定	4.8	26	108	圃場中央 約2往復 (324m)	

* GS110(T)・GS440(T) ; 吐出量が増加したため、30m幅の圃場であれば、中央片道1回の飛行で必要量が散布できます。

雑草が大きくなってしまっても、レブラスならしっかり枯らせます。

■ 適用雑草と使用方法

† 本剤及び、それぞれの有効成分を含む農業の総使用回数制限を示す。

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	総使用回数†	使用方法
移植水稲	一年生雑草 及び 多年生広葉雑草	移植後14日††~ ノビエ4葉期 ただし、 収穫60日前まで	400g /10a	本剤 1回 ジメタメトリン剤 2回以内 ダイムロン剤 3回以内 (育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) テフリルトリオン剤 2回以内 メタゾスルフロン剤 2回以内	湛水散布、 湛水周縁散布 または 無人航空機 による散布
		††:北海道は移植後 20~30日(ノビエ4葉期)。 ただし、収穫60日前まで。			
直播水稲	一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ、ウリカワ ミスガヤツリ ヒルムシロ、セリ	稲1葉期 ~ノビエ4葉期 ただし、 収穫60日前まで		本剤 1回 ジメタメトリン剤 2回以内 ダイムロン剤 2回以内 テフリルトリオン剤 2回以内 メタゾスルフロン剤 2回以内	

*1:登録は花茎20cmまでですが、安定した効果のため10cmまでの使用をお勧めします。*2:登録は草丈30cmまでですが、安定した効果のため10cmまでの使用をお勧めします。

■ 各種雑草の散布適期

雑草名	散布適期
ノビエ	4葉期まで
コナギ	6葉期まで
ホタルイ	花茎10cmまで*1
ウリカワ	4葉期まで
ミスガヤツリ	5葉期まで
ヘラオモダカ	4葉期まで
ヒルムシロ	発生盛期まで
セリ	再生期まで
オモダカ	矢尻葉3葉期まで
クログワイ	草丈30cmまで
コウキヤガラ	
シズイ	草丈10cmまで*2

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2022年12月現在の登録内容に基づいています。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号
ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>
お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00~17:30 土日祝日除く)