



雨にも負けず、
病気にも負けぬ！
保護力がジマンです。

ジマンダイセン[®] 水和剤

耐雨性がジマンです。



園芸用殺菌剤

3つのポイントが自慢です。

- ①優れた製剤技術「レインシールド[®]」テクノロジー
葉への付着が良く、耐雨性にも優れるため、持続性に優れた予防効果が実現します。
- ②幅広い病害を予防
りんごの10病害に登録があり、黒星病をはじめ、さまざまな病害の同時予防が可能です。
- ③多彩な作物に登録
広範な作物に登録があり、果樹や多種類の野菜などで幅広く使用されています。


ジマンダイセン® 水和剤

■適用病害と使用方法(抜粋)

※本剤及びマンゼブを含む農業の総使用回数

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	10アール当たり 使用液量(L)	使用時期	使用回数※	使用方法
りんご	斑点落葉病、赤星病、黒星病、黒点病、 モニリア病、すす点病、すす斑病、 輪紋病、褐斑病、炭そ病	500~600	200~700	収穫30日前まで	3回以内	散布


■りんご病害の発生消長と散布適期 (地域によって発生が違います)



■散布のポイント

- ◎黒星病防除で使用する場合は、5月中旬以降～6月までの防除が特におすすめです。耐雨性に優れた剤ですので雨前に散布するようにしてください。
この時期に使用することにより、黒点病の同時防除につながるだけでなく、斑点落葉病や褐斑病の初期防除にもつながります。
- ◎6月中旬から7月中旬の時期の雨前に使用することで炭そ病の防除につながります。
この時期に使用することにより、輪紋病だけでなく、斑点落葉病や褐斑病の同時防除にもつながります。
- ◎本剤は保護殺菌剤なので、発病前に散布をしてください。

■炭そ病に対する効果 長野県果樹試験場(2000年)




⚠ 使用上の注意

- 石灰硫黄合剤、ボルドー液、チオジカルブ剤との混用はさけてください。
- ボルドー液との7日以内の近接散布は薬害を生じるおそれがありますのでさけてください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。散布器具の洗浄水等は河川等に流さないでください。また、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。

⚠ 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 薬液調製時及び散布の際は、保護メガネ、農業用マスク、手袋、不透水性防除衣などを着用するとともに、保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗顔・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものと分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけてください。
- 夏期高温時の使用をさけてください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管ください。

■褐斑病防除での耐雨性 青森県産業技術センターりんご研究所(2021年)



- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 空袋は圃場等に放置せず、適切に処理してください。
- 防除日誌を記載しましょう。

本資料は2025年2月現在の登録内容に基づいています。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号 ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>
お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00~17:30 土日祝日除く)