

ぶどうで
更に使いやす
くなりました!



作物のキレイを守る!
予防力の高さも自慢です。

ジマンダイセン[®]フロアブル

園芸用殺菌剤

薬斑が残りにくい製剤で、作物の汚れを大幅に軽減。

- フロアブル製剤で、水和剤と比べ作物の汚れが少なく、また薬液の調製も簡便です。
- 作用点が複数存在し薬剤耐性菌出現リスクが低いので、安心してお使いいただけます。
- 時代をこえて愛され続ける保護殺菌剤です。



日産化学

®は登録商標



特長

- ① トマトの葉かび病・疫病、きゅうりのべと病・褐斑病、ぶどうのべと病・黒とう病・晩腐病、きくの白さび病に優れた予防効果を発揮します。
- ② ミツバチやマルハナバチなどの有用昆虫に対する影響が少ない剤です。



トマト・葉かび病



きゅうり・褐斑病



ぶどう・晩腐病



きく・白さび病

●適用病害と使用方法

※本剤及びマンゼブを含む農薬の総使用回数

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	散布量(ℓ/10a)	使用時期	総使用回数※	使用方法
トマト	葉かび病	800	150～300	収穫前日まで	2回以内	散布
	疫病	800～1,000			3回以内	
きゅうり	べと病、褐斑病	500～800		収穫7日前まで	5回以内	
メロン	べと病				2回以内	
ぶどう	べと病	800～1,000	200～700	収穫45日前まで	2回以内	
	黒とう病、晩腐病	800			8回以内	
きく	白さび病	500～800	150～300	――	8回以内	

(赤字は2022年7月適用拡大内容)

上手な使い方

予防効果と残効性を持つ保護殺菌剤で、体系防除中での基幹剤として病害発生前にご使用ください(浸透移行性はありません)。



有効成分のマンゼブは、ジチオカーバメート系の保護殺菌剤で、植物体上に付着し、主として孢子発芽を強く抑制することで病原菌の侵入を阻害し、殺菌効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

- 使用の際は容器をよく振って均一な状態にしてから所定量を取り出してください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液等アルカリ性薬剤及びチオジカルブ剤との混用はさけてください。
- 極端な高温多湿条件下では、軟弱幼苗に薬害ののおそれがあるので注意してください。
- トマトの葉かび病、きくの白さび病に対して使用する場合、発病後では効果がやや低いので発病初期から時期を逃さず散布してください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水などは河川などに流さないでください。また、空容器は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。

⚠ 安全使用上の注意



- 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけてください。
- 夏期高温時の使用はさけてください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。● 空容器は圃場等に放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。● 防除日誌を記載しましょう。

本資料は2022年7月現在の登録内容に基づいています。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号 ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>
 お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00～17:30 土日祝日除く)