

FMC

産卵させない。  
食入させない。

大事な幼果を傷めるシンクイムシ類に、

2023年8月23日  
りんごの  
アブラムシ類に  
適用拡大！

シンクイムシ類の交尾・産卵・食入を、  
即効ストップ・徹底阻止。収量・品質をアップ！



モモシンクイガ  
産卵・食入被害防止剤  
※効果持続期間



ナシヒメシンクイ  
産卵・食入被害防止剤  
※効果持続期間



ヒメボクトウ  
産卵・食入被害防止剤  
※効果持続期間



リンゴコカクモン  
ハマキ



キンモシホシガ



マメコガネ  
産卵・食入被害防止剤  
※効果持続期間



ワタアブラムシ

果樹・茶用殺虫剤 日産

イクシレール® SE

powered by  
CYAZYPYR®  
ACTIVE INGREDIENT



**特長1** 卓効成分シアントラニプロール(通称:サイアジピル®)ならではの優れた即効性、浸透性、残効による、高い産卵抑制、食入防止効果。

**特長2** 幅広い害虫への高い効果による、確実な同時防除。


**特長3** 海外における残留基準値も充実。輸出向けのりんご・なしにもご使用いただけます。



### 他剤に勝る、高い交尾阻害、産卵抑制効果(モモシンクイガ)

#### ●産卵抑制効果(成虫)

吸水、休息のため果実や葉に止まった際に有効成分と接触することで交尾阻害、産卵抑制効果を発揮。下記の試験では、エクシレル®SE区で害虫接種後4日間の産卵数が0となりました。




2019年 クミアイ化学工業(株)生物科学研究所  
【試験概要】◎品種:ふじ ◎区制:2果/カップ/区 2連制 ◎処理日:10月7日 ◎処理方法:エクシレル®SE 5000倍、対照A剤 2000倍、対照B剤 4000倍(クミテン5000倍加用)にりんご幼果を10秒間浸漬、風乾後、1カップあたり幼果を2果入れた。◎接種方法:羽化24時間以内の成虫を1カップあたり雄雌2対で接種した。◎調査方法:接種4日後に2果に産下された卵の合計数を調査。

### 他剤に勝る、高い殺ふ化幼虫効果(モモシンクイガ)

#### ●食入防止効果(幼虫)

有効成分の活性の高さ、優れた浸透性により、孵化幼虫に対しても高い防除効果を示し、食入を防ぎます。



2019年 クミアイ化学工業(株)生物科学研究所  
【試験概要】◎品種:ふじ ◎区制:1果/区 3連制 ◎処理日:10月18日 ◎処理方法:エクシレル®SE 5000倍、対照A剤 2000倍、対照B剤 4000倍(クミテン5000倍加用)に産卵4日後の幼果を10秒間浸漬し、風乾後、23~25℃(16L8D)湿度60%以上で管理。◎調査方法:処理7日後に幼果の食入痕を計算。

### 適用害虫と使用方法

2023年8月23日現在

| 作物名 | 適用害虫名                                                        | 希釈倍数       | 使用液量         | 使用時期   | 本剤の使用回数 | 使用方法 | シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数 |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|---------|------|-----------------------|
| りんご | アブラムシ類                                                       | 2500倍      | 200~700ℓ/10a | 収穫前日まで | 3回以内    | 散布   | 3回以内                  |
|     | ハマキムシ類<br>シンクイムシ類<br>ヒメボクトウ                                  | 2500~5000倍 |              |        |         |      |                       |
|     | キンモンホソガ<br>ギンモンハモグリガ<br>ケムシ類<br>ヨモギエダシャク<br>オオタバコガ<br>コガネムシ類 | 5000倍      |              |        |         |      |                       |
| なし  | ハマキムシ類<br>シンクイムシ類<br>ヒメボクトウ                                  | 2500~5000倍 | 200~700ℓ/10a | 収穫前日まで | 3回以内    | 散布   | 3回以内                  |
|     | ケムシ類                                                         | 5000倍      |              |        |         |      |                       |
|     | アブラムシ類                                                       | 2500倍      |              |        |         |      |                       |

その他の適用作物:もも、ネクタリン、おうとう、小粒核果類(すももを除く)、すもも、ぶどう、かんきつ、かんきつ(苗木)、ブルーベリー、いちじく、マンゴー、茶

●ラベルをよく読んでください。 ●記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。  
●空容器は園場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。 ●防除日誌を記帳しましょう。

©2023 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC、FMCロゴ、®を付した商標は、FMC Corporationまたはその米国およびその他の国の子会社・関連会社の登録商標です。

EXI-SHA3A



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号  
ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>  
お客様窓口 TEL.03-4463-8271(9:00~17:30 土日祝日除く)

製品情報は  
こちらから➡

