

# ヤハズソウには、これ！

発生前の散布が効果的ですが、発生初期でも有効な結果が得られています。

## 発生初期処理の効果

イデトップ現地試験  
2週間後の無処理区との比較

[薬量] 0.1ml/m<sup>2</sup> [水量] 200ml

[散布日] 6月29日

[調査日] 7月13日 (撮影)




無処理区



イデトップ処理区

## ■ 季節の消長と防除

| ヤハズソウ                                                                                                                                                                                 |          | 1月                                                                                  | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月                   | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------|----|----|-----|-----|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ マメ科</li> <li>・ 全国に分布</li> <li>・ 開花時草高 20~40 cm</li> </ul>  | 発生活長     |                                                                                     |    |    |    |    |    |                      |    |    |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                       | 幼植物の出現時期 |                                                                                     |    |    |    |    |    |                      |    |    |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                       | 花期       |                                                                                     |    |    |    |    |    |                      |    |    |     |     |     |
| 薬剤による防除時期                                                                                                                                                                             |          |  |    |    |    |    |    |                      |    |    |     |     |     |
| 使用薬剤                                                                                                                                                                                  |          | イデトップフロアブル                                                                          |    |    |    |    |    | プラスコンM<br>イデトップフロアブル |    |    |     |     |     |

## ■ 適用作物と使用方法

| 作物名 | 適用場所                                         | 適用雑草名 | 使用時期                     | 使用量                             |                              | 本剤の使用回数 | 使用方法                             | トリアジフラムを含む農薬の総使用回数 |
|-----|----------------------------------------------|-------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------|
|     |                                              |       |                          | 薬量                              | 希釈水量                         |         |                                  |                    |
| 日本芝 | —                                            | 一年生雑草 | 芝生育期<br>(雑草発生前<br>~発生初期) | 0.075~0.15<br>ml/m <sup>2</sup> | 200~300<br>ml/m <sup>2</sup> | 2回以内    | 全面土壌散布                           | 2回以内               |
| 樹木等 | 公園、庭園<br>堤とう、駐車場<br>道路、運動場<br>宅地、のり面<br>鉄道 等 |       | 雑草発生前                    | 0.1~0.2<br>ml/m <sup>2</sup>    | 100~200<br>ml/m <sup>2</sup> |         | 植栽地を除く<br>樹木等の<br>周辺地に<br>全面土壌散布 |                    |

除草剤

**イデトップ**® フロアブル

ヤハズソウ  
イネ科雑草  
同時防除



## ●使用上のポイント

### 1. 雑草の発生前の散布が効果的です

薬量は  $0.1 \text{ ml} / \text{m}^2$  で散布してください。また、スズメノカタビラが多発場所では、散布時期は 10 月以降とし、茎葉処理剤と組み合わせて散布してください。

### 2. 散布水量は多めの方が効果は安定します

散布水量は  $200 \text{ ml} / \text{m}^2$  以上として、均一に散布してください。

### 3. 張り芝直後には散布しないでください


張り芝直後は、芝のターフ形成を抑制するなどの薬害を生じることがありますので、使用しないでください。

### 4. グリーンには散布液が直接かからないようにしてください

踏み込みやドリフトによる薬害の心配はありませんが、ペントグリーンまわりは 2~3m 離して散布してください。降雨による流れ込みの危険性がある、のり面には散布しないでください。

## ●イデトップフロアブルの処理適期

図は関東地方の発生活消長を示しています。



### 春 夏 雑 草



### 秋 冬 雑 草



## ●雑草スペクトラム

| 雑 草 名   |          | 雑草発生前処理<br>薬量 $0.1 \text{ ml} / \text{m}^2$ | 雑草発生初期処理<br>薬量 $0.1 \text{ ml} / \text{m}^2$ |
|---------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| イネ科     | メヒシバ     | ●                                           | ●                                            |
|         | アキメヒシバ   | ●                                           | ●                                            |
|         | エノコログサ   | ●                                           | ●                                            |
|         | スズメノカタビラ | ●                                           | ●                                            |
| トウダイグサ科 | コニシキソウ   | ●                                           | ●                                            |
| マメ科     | ヤハズソウ    | ●                                           | ●                                            |
|         | カラスノエンドウ | ●                                           | ●                                            |
|         | クローバー    | ◎                                           | ○                                            |
| コマノハグサ科 | タチヌノフグリ  | ●                                           | ●                                            |
|         | オオイヌノフグリ | ●                                           | ●                                            |

| 雑 草 名   |           | 雑草発生前処理<br>薬量 $0.1 \text{ ml} / \text{m}^2$ | 雑草発生初期処理<br>薬量 $0.1 \text{ ml} / \text{m}^2$ |
|---------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ナデシコ科   | オランダミミナグサ | ●                                           | ●                                            |
|         | ツメクサ      | ●                                           | ◎                                            |
|         | ハコベ       | ●                                           | ◎                                            |
| スベリヒユ科  | スベリヒユ     | ●                                           | ◎                                            |
| アブラナ科   | ナズナ       | ●                                           | ●                                            |
| キク科     | オオアレチノギク  | ●                                           | ○~△                                          |
|         | ハルジオン     | ●                                           | ○~△                                          |
|         | ノボロギク     | ●                                           | ○~△                                          |
| カヤツリグサ科 | ハマスゲ      | ×                                           | ×                                            |
|         | ヒメクグ      | ×                                           | ×                                            |

日植調委託試験・社内試験より作成 ●: 極大 ◎: 大 ○: 中 △: 小 ×: 無

● 使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ● ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。



日産化学株式会社

Lawn & Specialty Products

### お問い合わせ

・北海道 / 東北 / 関東 / 甲信越の皆様は・・・  
 ・近畿 / 中国 / 四国の皆様は・・・  
 ・東海 / 北陸の皆様は・・・  
 ・九州 / 沖縄の皆様は・・・

営業本部 緑化営業部  
 大阪オフィス 緑化営業部  
 名古屋オフィス 緑化営業部  
 福岡オフィス 緑化営業部

TEL: 03-4463-8290 FAX: 03-4463-8291  
 TEL: 06-6346-7150 FAX: 052-452-8621  
 TEL: 052-452-8614 FAX: 06-6346-7230  
 TEL: 092-473-3891 FAX: 092-473-3891