





水稻は
収穫7日前まで
使用可能!



広範囲の
害虫に!




速効的!

広い適用作物!

総合殺虫剤



日産 **エルサン**® 乳剤



特長

- 稲、果樹、野菜、茶、桑など広範囲の作物に適用があり、汎用性のある薬剤です。
- 速効的であり、また各種害虫の同時防除が可能です。
- 特に水稻に関しては、収穫7日前まで使用できるので、稲作害虫に有効です。

適用害虫と使用方法

使用方法：散布

使用方法：散布

適用作物	適用害虫	希釈倍率 (倍)	10a当り 使用液量 (ℓ)	使用時期*	総使用 回数*		
稲	ニカメイチュウ第1世代	1,000~1,500	60~150	7日	2回		
	ニカメイチュウ第2世代	800~1,000					
	サンカメイチュウ第3世代	1,500~2,000					
	ツマダグロヨコバイ ヒメトビウンカ イネヒメハモグリバエ	1,000					
	カメムシ類 アブラムシ類 フタオビコヤガ	1,000~2,000 2,000					
小麦	アブラムシ類 ムギクロハモグリバエ アワヨトウ ムギキモグリバエ	1,000	200~700	14日	4回		
	ヤノネカイガラムシ アブラムシ類	1,000~1,500					
かんきつ	ミカンサビダニ ミカントゲコナジラミ ミカンコナジラミ ハマキムシ類 ミカンハモグリガ カイガラムシ類(ヤノネカイガラムシを除く)	1,000	200~700	14日	2回		
	カメムシ類 アザミウマ類 ケシキスイ類 ゴマダラカミキリ成虫 ミカンバエ成虫	1,000					
	モモノゴマダラノメイガ クリイガアブラムシ カツラマルカイガラムシ若齢幼虫 クスサン	1,000					
	キャベツ カリフラワー はくさい だいこん カリフラワー ブロッコリー かぶ	1,000~2,000 1,000				キャベツ カリフラワー 14日 はくさい 21日 ブロッコリー だいこん かぶ 30日	キャベツ だいこん かぶ カリフラワー ブロッコリー 2回
	ダイコンハムシ オオニジュウヤホシテントウ アブラムシ類 ホウレンソウケナガコナダニ	1,000~2,000				30日	2回
ほうれんそう	アブラムシ類	1,000~2,000	21日	1回			
レタス にんじん	ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1,000	レタス 21日 にんじん 90日	レタス 2回 にんじん 1回			
すいか しろり まくわうり メロン かぼちゃ	アブラムシ類 アザミウマ類	1,000~2,000 1,000	3日	すいか しろり かぼちゃ 3回 まくわうり メロン 4回			

適用作物	適用害虫	希釈倍率 (倍)	10a当り 使用液量 (ℓ)	使用時期*	総使用 回数*
わけぎ	アザミウマ類	1,000	100~300	14日	4回
	ねぎ たまねぎ	アブラムシ類		1,000~2,000	ねぎ 21日 たまねぎ 7日
かんしょ	ヒルガオハモグリガ ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	1,000	100~300	7日	4回
	ヨトウムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 ニジュウヤホシテントウ	1,000~2,000		14日	2回
ばれいしょ	アブラムシ類	1,000~2,000	100~300	7日	1回
	アブラムシ類 ハスモンヨトウ	1,000		7日	3回
さといも	アブラムシ類 ハスモンヨトウ	1,000	100~300	21日	2回
	豆類 (種実、ただし、らっかせい、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめを除く)	アブラムシ類		1,000~2,000	7日
だいず	マメシンクイガ カメムシ類 ハスモンヨトウ ツメクサガ	1,000	100~300	7日	2回
	シロイチモジマダラメイガ	1,500~2,000			
あずき	アズキノメイガ マメホソクチゾウムシ	1,000	100~300	7日	2回
	アブラムシ類	1,000~2,000			
いんげんまめ さやいんげん	フキノメイガイ インゲンテントウ	1,000	100~300	7日	いんげんまめ 2回 さやいんげん 1回
	ヨトウムシ ハスモンヨトウ エンドウハモグリバエ	1,000~1,500			
えんどうまめ さやえんどう	アブラムシ類	1,000~2,000	100~300	7日	えんどうまめ 2回 さやえんどう 1回
	未成熟そらまめ	1,000			
とうもろこし アスパラガス	アワノメイガ ジュウシホシビナガハムシ	1,000	100~300	14日	4回
	アブラムシ類	1,000		3日	2回
食用ゆり	アブラムシ類 クワシロカイガラムシ チャドクガ コカクモンハマキ	1,000	100~300	7日	3回
	茶	クワシロカイガラムシ チャドクガ コカクモンハマキ		1,000	最終摘採後から 冬期まで
桑	クワノメイガ ハゴロモ類	1,000~1,500	120	15日	4回
	ヒシモンヨコバイ クワヒメゾウムシ カミキリムシ類	1,500~2,000 200~300			
	クワシロカイガラムシ ヒメコシンクイ	1,000 1,200			
	クワシロカイガラムシ	1,000			
きく	キクヒメヒゲナガアブラムシ	1,000~2,000	100~300	—	2回

*印は、収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫(摘採)前の日数と、本剤及びPAPを含む農薬の総使用回数の制限を示します。

本資料は2023年9月現在の知見に基づいて作成されています。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号
ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>
お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00~17:30 土日祝日除く)