

生育期のセイバンモロコシ、ススキ、オギ等の除草に!

一年生から多年生^{*}まで、小型から大型まで
幅広くイネ科雑草を選択的に除草する

※スズメノカタビラを除く



セイバンモロコシ



ススキ



オギ

道路・堤防・公園などの
緑地管理におすすすめ!!

®は日産化学(株)の登録商標

緑地管理用除草剤

グリーンタルガ[®]フロアブル

キザロホップエチル 7.0%

2.5ℓ入



登録番号：農林水産省登録第 24980号

緑地管理用除草剤

グリーンタルガ[®]フロアブル

◆登録番号：農林水産省登録第 24980号

◆人畜毒性：普通物*

◆有効成分：キザロホップエチル7.0%

◆包装：2.5ℓ×6

*毒劇物に該当しないものを指して言う通称

適用雑草と使用方法

適用作物	適用場所	適用雑草	使用時期	10アール当り使用量		使用方法	使用回数
				薬量	希釈水量		
樹木類	—	一年生および 多年生イネ科 雑草（スズメ ノカタビラを 除く）	雑草生育期	500～ 1000ml	通常散布 50～100ℓ 少量散布 25～50ℓ	雑草茎葉散布	本剤:2回以内 キザロホップエチル: 2回以内
樹木等	公園、堤とう、 駐車場、道路、 運動場、宅地、 のり面、鉄道					植栽地を除く 樹木等の周辺 地に雑草茎葉 散布	本剤:3回以内 キザロホップエチル: 3回以内

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。
- 散布液の調製に当たっては、本剤の所要量を所定量の水にうすめ、良くかき混ぜてから散布してください。
- 本剤の散布時期は雑草生育期（草丈30cm以下）であり、生育の進んだ雑草には効果が劣るので時期を失しないように散布してください。
- 広葉雑草及びカヤツリグサ科には効果が期待できないので、イネ科雑草優占ほ場で使用してください。なお、広葉雑草などが混在する場合は、これらの雑草に有効な除草剤との体系で使用してください。
- 雑草茎葉にかかるよう散布してください。
- イネ科雑草を完全に枯殺するまでには約2-4週間を要し、冬期などの低温の場合には更に期間を要する場合がありますので、誤って撒き直しなどしないように注意してください。
- 出穂期以降など、雑草の生育が停滞している場合には、効果が劣ることがあるので登録内の高薬量を使用し、効果が不十分な場合には他の除草剤との体系処理などで防除してください。
- 激しい降雨の予想される場合は使用をさけてください。
- 少量散布(25～50L/10a)の場合は、専用ノズルを使用してください。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 水源池、養殖池等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意してください。
- 散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、空容器等は、環境に影響を与えないよう適切に処理してください。

⚠ 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬液が眼に入らないよう注意してください。
- 眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。

● 使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ● ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

お問合せ先



日産化学株式会社

農業化学品事業部 緑化営業部

TEL：03-4463-8290

MAIL：enq_agri@nissanchem.co.jp



日産化学ホームページ
アグロネット