

「カメムシ」にも、 グレーシア乳剤！

だいず・えだまめ生産者様に朗報！

グレーシア乳剤がついに、
だいず・えだまめの「カメムシ類」に適用拡大！
厄介な吸汁被害の防止にぜひご活用ください。

無人航空機での
散布も可能！

速く効く。あの害虫^{*1}にも効く。だから、収量に差^{*2}がつく。

野菜・
茶用
殺虫剤

グレーシア[®]乳剤

- 有効成分フルキサメタミド配合
- カメムシ類、ハスモンヨトウの同時防除が可能
- 葉内に薬剤が浸透、葉裏の害虫も退治



*1 作物によって適用害虫は異なります。詳しくは裏面をご覧ください。*2 効果は害虫の発生密度や天候、栽培環境等によって異なる場合があります。®は日産化学(株)の登録商標

特長

- ◎グレースィア乳剤は、**だいず・えだまめのカメムシ類に吸汁阻害効果**を示します。
- ◎グレースィア乳剤なら、**ハスモンヨトウの同時防除**も可能です。
- ◎さらに、**無人航空機**（ドローン等）を用いた**少水量散布**も可能です。

だいず・えだまめを加害する「カメムシ類」



エソアオカメムシ



ホンヘリカメムシ




ミナミアオカメムシ




イチモンジカメムシ

■カメムシ類の吸汁を阻害します。



2025年鹿児島県鹿児島市圃場（日産化学社内試験）
対象害虫：カメムシ類
発生状況：中発生
試験方法：高濃度はドローン処理、2000倍は背負い式動力噴霧器処理
調査方法：任意のだいず10株を収穫し全莢を採取して脱粒、カメムシ類の吸汁痕の有無（被害粒数）を計数
散布日：6月24日、7月9日
調査日：8月4日

■ハスモンヨトウに卓効・同時防除が可能です。



■散布前 ■散布2日後 ■散布6日後 ■散布14日後

2025年鹿児島県鹿児島市圃場（日産化学社内試験）
対象害虫：ハスモンヨトウ
発生状況：放虫
試験方法：高濃度はドローン処理、2000倍は背負い式動力噴霧器処理
散布日：7月9日
調査日：7月9日、11日、15日、23日

適用害虫と使用方法（抜粋）

*本剤及びフルキサメタミドを含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量（/10a）	使用時期	総使用回数*	使用方法
だいず	アザミウマ類、マメシクイガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、ウコンノメイガ、オオタバコガ、フタスジヒメハムシ、ハダニ類、カメムシ類	2000～3000倍	100～300g	収穫 14日前まで	2回以内	散布
	ハスモンヨトウ	16倍	0.8～1.6g			無人航空機による散布
	カメムシ類、マメシクイガ		1.6g			無人航空機による散布
えだまめ	アザミウマ類、マメシクイガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、ウコンノメイガ、オオタバコガ、フタスジヒメハムシ、ハダニ類、カメムシ類	2000～3000倍	100～300g	収穫 前日まで	2回以内	散布
	ハスモンヨトウ	16倍	0.8～1.6g			無人航空機による散布
	カメムシ類、マメシクイガ		1.6g			無人航空機による散布

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

最新の
製品情報は
こちら



本資料は2026年9月現在の登録内容に基づいています。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号
ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>
お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00～17:30 土日祝日除く)