

2016年1月6日

お客様 各位

ピリダベン剤の登録内容変更（使用制限）に関するお知らせ

拝啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、掲題につきまして下記のとおり 2016年1月6日に使用制限となる登録変更が行われましたのでお知らせいたします。

敬具

記

【対象登録薬剤】

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第17814号	サンマイトフロアブル	ピリダベン水和剤	日産化学工業株式会社

【登録変更の時期】 2016年1月6日

【変更申請内容】

作物名 「トマト」「ミニトマト」を削除する。

【変更後の適用表】

別紙1参照

【変更理由】

新たに導入された短期暴露評価に対応して短期的な摂取量を試算した結果、登録の維持には試験成績の整備が必要であることが判明し、それには経費と時間を要することから、登録変更をすることとしたため。

以上

サンマイトフロアブル【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリダベンを含む農薬の総使用回数
かんしょ	ハダニ類 コナジラミ類	1000～1500 倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
さといも	ハダニ類			収穫21日前まで			
えだまめ	コナジラミ類	1000倍		収穫14日前まで	1回		1回
あずき	ハダニ類	1000～2000 倍		収穫7日前まで	2回以内		2回以内
きゅうり	ハダニ類 コナジラミ類	1000～1500 倍		収穫前日まで			
すいか メロン	アブラムシ類 うどんこ病			収穫3日前まで			
かぼちゃ	コナジラミ類 うどんこ病						
うり類 (漬物用、ただし、しろうりを除く)	アブラムシ類 ハダニ類	1000～1500 倍		収穫前日まで	1回		1回
ピーマン	コナジラミ類						
いちご	ハダニ類 ワタアブラムシ チャノホコリダニ シクラメンホコリダニ コナジラミ類	1000～1500 倍		収穫前日まで	2回以内		散布、 但し花穂の発生期には マルチフィルム被覆により 散布液が直接花穂に飛散し ない状態で使用する
みょうが (花穂)	ハダニ類	1000倍					
みょうが (茎葉)			みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない 場合にあっては開花期終了まで	散布			

サンマイトフロアブル【変更後、続き】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリダベンを含む農薬の総使用回数
せんぶり	シクラメンホコリダニ	1000～1500倍	100～300 L/10a	収穫75日前まで	1回	散布	1回
しそ	ハダニ類	2000倍		収穫21日前まで			
しそ(花穂)				収穫14日前まで			
ししとう	コナジラミ類	1000～1500倍		定植前	2回以内		2回以内
ふき		1000倍		収穫14日前まで			
にがうり		1500倍		収穫前日まで			
しょくようほおずき				収穫3日前まで			
食用ぎく	ハダニ類 アブラムシ類	1000倍		収穫21日前まで			
きく(葉)	ハダニ類	2000倍		収穫30日前まで			
茶	カンザワハダニ	1000倍		400L/10a			
	チャノキイロアザミウマ						
	チャノミドリヒメヨコバイ チャノナガサビダニ チャノホコリダニ	1000～2000倍	200～400 L/10a				
きく	ハダニ類 アブラムシ類	1000倍	100～300 L/10a	—			
カーネーション	ハダニ類						
ポインセチア	コナジラミ類						